

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

МИХАИЛ ДУБРОВ

ПУДЕЛЬ



БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОГО СОБАКОВОДСТВА

БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОГО СОБАКОВОДСТВА

Михаил Дубров

ПУДЕЛЬ




Москва
ЦЕНТРОЛИГРАФ
2003

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)-445
Д79

Серия
«БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОГО СОБАКОВОДСТВА»
выпускается с 1996 года

© Дубров М.З., 2003

Состав

© ЗАО «Издательство «Центрполиграф», 2003

Дизайн серии

© ЗАО «Издательство «Центрполиграф», 2003

ISBN 5-227-00963-5

Охраняется Законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона будут преследоваться
в судебном порядке.

СОДЕРЖАНИЕ

ПУДЕЛЬ

1. ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОРОДЫ	9
2. СТАНДАРТ ПОРОДЫ	11
3. ВЫБОР ШЕНКА	22
Несколько слов о родословной	32
Коротко об окрасах	32
4. ШЕНОК В ДОМЕ	35
5. ПРОФИЛАКТИКА ВЕДУЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	38
Особо опасные вирусные заболевания	41
Экзопаразиты	48
Другие часто встречающиеся заболевания	54
6. ГРУМИНГ, КОРМЛЕНИЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ТРЕНИНГ	74
Грумминг	74
Кормление	83
Социализация	88
Тренинг	92
Обучение шенка основным навыкам	93
Обучение хорошим манерам	94
Покорное мочеиспускание	107

7. РАЗВЕДЕНИЕ 109

Натурализация 110

Племенная сука 112

Племенной кобель 117

Отбор и подбор пар 121

Вязка 123

Оплодотворение 125

Шенность 127

Шенение 131

Окончание родов 133

Осложнения после шенения 134

Наблюдение за щенками 135

Наблюдение за сукой 136

Социализация щенков 136

Отлучение щенков от матери 138

Минута расставания 139

ПУДЕЛЬ

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОРОДЫ



Уже в 30-х годах до н. э. мы встречаем на барельефах римских гробниц, на греческих и римских монетах изображения львообразных или пуделеподобных собак, подстриженных под льва, но не можем с уверенностью сказать, что они имеют хоть какое-нибудь отношение к современному пуделю. Изображения пуделя можно увидеть на рисунках колонн монастыря Мон-Реале на Сицилии и росписях кафедрального собора аббатства Сен-Реми в Реймсе, Франция, относящихся к XII—XIII векам. В европейской живописи и скульптуре XIV—XV веков легко узнается модный в то время миниатюрный пудель. Письменные же упоминания о пуделе как о самостоятельной породе мы встречаем лишь с XV века.

Мнения кинологов о происхождении трех разновидностей пуделя расходятся. Большинство из них считает, что пудель как таковой ведет свое происхождение из трех стран — России, Франции и Германии.

Российские шнуровые пудели чем-то напоминали английских гончих — грейхаундов, немецкие же были более крепкими, густопсовыми, с курчавыми, как у овцы, волосами и обожали воду, из-за чего и были названы пуделем, что в переводе с немецкого означает «плещущийся в воде».

Во Франции, где порода считается национальной, встречается несколько разновидностей пуделя. Одна из них — малый барбет, собака типа той-пуделя, возможно несущего в своих жилах крови той-спаниеля и мальтеза. Французский каниш был крупней и использовался исключительно для охоты на уток, неся на себе отпечаток водяного спаниеля. Еще один тип представляла «трюфельная» собака, отыскивавшая крошечные грибы, высоко ценящиеся французскими кулинарами.

Пуделеподобные собаки существовали и в Англии, причем первое документальное свидетельство об этом относится к 1642 году.

Конституция и экстерьер пуделей должны были отвечать тому предназначению, которое отвел этим собакам человек, и их стрижка напоминает нам об этом. Масса свидетельств указывает на то, что в период формирования породы пуделей выводили для подноски дичи с воды. Собаки находились в естественном виде, чтобы густая шерсть могла защитить их грудную клетку и область сердца от воздействия холода и травм, которые они могли получить в воде. Но длинная шерсть мешала им брать дичь с воды, затрудняя движения задних конечностей. Чтобы избежать этого и облегчить работу собаки, их стали стричь.

Современная стрижка «Континенталь» напоминает нам о тех первых моделях, которые диктовались функциональным предназначением собаки, но она никак не укладывается в моду французского королевского двора того времени, когда знать носила роскошные пышные локоны и напудренные парики. Но если мы мысленно прибавим собакам «розетки» на бедрах, «помпон» на хвосте и «буфы» на конечностях, то перед нами предстанет щегольская стрижка с вычурными деталями, прекрасно согласующимися с модой той эпохи.

2

СТАНДАРТ ПОРОДЫ

ПУДЕЛЬ

Официальный стандарт FCI¹ № 172



Страна происхождения. Франция.

Происхождение и общий вид. Элегантный, гармонично сложенный, с горделиво поставленной головой, щеголеватый, всегда нарядный, с безупречными манерами пудель — снисходительно-доброжелательный, всегда в хорошем настроении, готовый к любым шалостям и проказам, с внимательным, умным взглядом темных глаз и легкой, танцующей походкой. Эта собака хоть и не говорит, но лучше всех понимает человека и готова следовать за ним всюду — и подчиняться, и любить, и беречь, и охранять...

Первые барельефы с изображением собак, напоминающих пуделя, были найдены по берегам Средиземного моря и датируются I веком. Особенно много их было найдено на острове Мальта, бывшем Мелита, где разводили маленьких мелитских собак, известных сегодня как мальтез.

Несмотря на то, что французы многие годы считали пуделя своей национальной гордостью, используя его для аппортировки дичи с суши и с воды, а также как непре-

¹ FCI — Международная кинологическая ассоциация.



взойденного клоуна в цирковых балаганах, называя собак «каниш» или «шьен канар» (от chien canard — «собака по утке»), страной происхождения породы считается Германия, где она была известна с XV века как «Canis Familiaris Aquaticus», «пудель» или «пуделин», что означает «водяная собака». Это действительно прекрасная птичья собака, владеющая всеми навыками ретривера. Да и сегодня пудель напоминает староанглийскую жесткошерстную водяную собаку конца XVII — начала XIX века.

Первым появился большой, или стандартный пудель, называемый в России королевским, а уж из него были получены остальные три разновидности, отличающиеся только по высоте в холке. Причем той-пудель был известен уже в XVIII веке и назывался «белым кубинцем», так как считалось, что он произошел из Вест-Индии, откуда попал в Испанию, а уж затем — в Англию.

Фигурная стрижка появилась в породе из-за того, что стриженному пуделю легче было работать в воде, чем оброслому. Отличный нюх этих собак широко использовался не только для повторного разыскивания подранков и убитой дичи, но и для нахождения трюфелей.

Пуделем восхищались немецкий живописец Альбрехт Дюрер (1471—1528), английская королева Анна Стюарт (1665—1714), испанский живописец Франсиско Хосе де Гойя (1746—1828) и французский король Людовик XVI (1754—1793). Современный пудель не менее популярен благодаря своему интеллекту, легкой обучаемости, послушанию, дружелюбию, преданности и не утраченным рабочим качествам.

Половой тип. Хорошо выражен, особенно у большого и среднего пуделя, и умеренно выражен у миниатюрного (малого, каниша, или барбоне) и той-пуделя (карликового, или цверг-пуделя). Кобели более крепкие, выносливые, мускулистые, суки более женственные и внимательные.

Пороки: суки в кобелином типе.

Особенности поведения и характера. Собаки энергичные, отважные, высокоинтеллектуальные. Темперамент уравновешенный, сильный, подвижный. Собаки очень

легко дрессируются благодаря желанию угодить своему другу и хозяину.

Недостатки: заторможенность, робость, нервозность.

Пороки: злобность, трусость.

Тип конституции крепкий, с сухой, плотной и крепкой мускулатурой и плотно прилегающей пигментированной кожей, не просвечивающей через шерсть. У черных, коричневых, серых и абрикосовых пуделей кожа пигментирована в тон основному окрасу, у белых она может быть пятнистой (чаще всего на животе и внутренней поверхности конечностей) или серебристой. Мочка носа, кайма век, губ, десны, нёбо, видимые слизистые оболочки, естественные отверстия, мошонка и подушечки лап — наиболее пигментированные. У белых, черных и серых собак пигмент черный, у коричневых — темно-коричневый, у абрикосовых — более темного тона, вплоть до темно-коричневого и практически черного.

Недостатки: незначительные отклонения от типа конституции в сторону легкости или грубости.

Пороки: значительные отклонения от типа конституции, слабая мускулатура, гипофизарный нанизм (карликовость) или признаки инфантилизма, неполная пигментация кожи, кроме белых собак, ожирение, истощение.

Рост

Большой пудель

Высота в холке: 45—60 см.

Пороки: рост выше максимального в пределах 2 см.

Средний пудель

Высота в холке: 35—45 см.

Миниатюрный пудель

Высота в холке: 28—35 см.

Той-пудель

Высота в холке: менее 28 см, предпочтительнее — 25 см.

Формат приближается к квадратному. **Индекс формата:** у кобелей — 100—102, у сук — 100—105.

Недостатки: незначительные отклонения от указанного формата.

Пороки: растянутый или излишне укороченный формат; приземистость или высоконогость.

Шерстный покров

Курчавая шерсть — очень густая, тонкая, длинная, упругая, вьющаяся или кудрявая, при приглаживании тут же возвращается на прежнее место, на ощупь — жесткая, как у лошади, одинаковой длины на любом участке тела, образует локоны и требует выставочного тримминга для придания собаке стандартного силуэта.

Недостатки: недостаточно упругая, коротковатая, в слабом завитке шерсть.

Пороки: прямая, мягкая шерсть, толстый волос.

Шнуровая шерсть — густая, тонкая, курчавая и жесткая на ощупь, формирующая характерные тугие прямые шнуры около 20 см длиной — чем они длиннее, тем более высоко ценятся. Шнуры по бокам головы можно собрать перед выставкой в два топнота, причем шерсть на остальных участках тела также должна быть приведена в порядок.

Пороки: прямая, мягкая шерсть, толстый волос. Неухоженная шерсть.

Стрижки

«Английское седло»

При этом морду, горло, лапы, конечности и основание хвоста выбривают, оставляя «кружева» над лучезапястными и скакательными суставами, «запонки» на плюснах и «помпон» на конце хвоста. Задняя часть корпуса покрыта короткой попой, за исключением подковообразно выбритой на нет области на каждом боку. Лапы и конечности выше «кружев» должны быть тщательно выбриты машинкой. На остальных частях тела оставляют длинную шерсть. На голове волосы обязательно должны быть собраны в топнот. На задних конечностях не обязательно разделять «кружева» от «запонок».

«Лев»

Шерсть на задней части корпуса, включая конечности, кроме плюсен, состригается на нет, вплоть до реберной дуги. На морде, лицевой части черепа, включая щеки, шерсть состригается на нет (усы желательно оставить). На передних конечностях и на плюснах оставляются «кружева», а иногда и «запонки», а на хвосте круглый или продолговатый «помпон».

Наличие отфилированных штанов на передних конечностях допускается.

«Модерн»

Шерсть на лапах до пятого пальца на передних и до плюсно-заплюсневого сустава на задних конечностях состригается почти на нет (машинкой стрижется только шерсть на пальцах) и слегка филируется на голове и хвосте, чтобы получились воздушная шапочка (волосы можно собрать в топнот) и «помпон». Волосы на подбородке коротко подстригаются (до 1 см длиной) параллельно краю нижней челюсти, чтобы не было козлиной бороды.

На корпусе оставляют шерсть длиной в 1 см, чтобы она напоминала шелковистый муар. Она должна незаметно сливаться с чуть более длинной шерстью на боках, груди и конечностях.

Шапочка на голове должна плавно сливаться с чуть более короткой шерстью на шее, незаметно переходящей к коротким волосам на холке и несколько длинным на фронте. Чтобы сокол груди, слегка выступающий за линию плечелопаточных суставов, не бросался в глаза, волосы над ним филируют, несколько уплощая фронт. Для придания глубины груди волосы в области грудины за локтями оставляют чуть более длинными и постепенно укорачивают к паху, повторяя нижнюю линию корпуса. Основание и максимум треть ушей может быть подстрижена ножницами или тщательно отфилирована, чтобы на оставшихся двух третях остались равномерно длинные волосы, спускающиеся ниже края ушного полотна.

Шерсть на конечностях снимается до лап, чтобы получились более широкие в плечах и бедрах (длиной 4—7 см) и более узкие у пястей и плюсен, свободные прямые, как колонны, при осмотре спереди и сзади и такие же отполированные (отфилированные) штаны. При осмотре собаки сбоку углы сочленений должны быть хорошо видны.

Окрас белый, черный, серый, коричневый и абрикосовый.

1. **Коричневый** — должен быть чистым, темным, холодным или теплым. Никогда не должен быть светлым,

тем более бежевым, или темно-коричневым, практически черным, то есть выглядеть темно-фиолетовым, как баклажан.

2. **Серый** — должен быть однотонным, без примеси белого или черного.

3. **Абрикосовый** — должен быть однотонным, без тенденции к бежевому, кремовому, красному, темно-рыжему, коричневому оттенкам или их производным.

Недостатки: несколько белых волос на груди у цветных собак.

Голова сухая, пропорциональна размеру собаки. Длина головы чуть меньше $\frac{2}{5}$ высоты собаки в холке, удлиненная, клинообразная, изящная, с выступающим затылочным бугром. **Череп** не широкий (чуть меньше половины длины головы). Надбровные дуги умеренно выражены. **Щеки** и скулы плоские. **Лоб** плоский (под углом 16—19° к верхней линии черепа), разделен посередине широкой у переносицы и постепенно суживающейся к затылочному бугру бороздой. **Переход от лба к морде** слегка подчеркнут. **Морда** крепкая, сухая, хорошо заполненная под глазами, спинка носа прямая, параллельная линии черепа и нижнему краю нижней челюсти, чуть меньше половины длины головы ($\frac{9}{10}$ длины черепа) и не заостренная. Подбородок достаточно выражен, морда не острая, спинка носа прямая. **Губы** сухие, плотно прилегающие, пигментированные. **Челюсти** равной длины, крепкие.

Недостатки: чуть грубоватая или легковатая голова, небольшая скуластость, несколько выпуклый лоб, коротковатая, длинноватая или чуть заостренная, слегка опущенная или вздернутая морда, чуть сыроватые губы.

Пороки: те же отклонения, но выраженные в более резкой степени, прилобь, или закатистый лоб, конвергенция или дивергенция линий головы и морды, сглаженный или резкий переход от лба к морде, римский нос (горбоносость), маленькая, пятнистая или розовая мочка носа, слишком крупные или слипшиеся ноздри.

Уши низко поставленные, длинные (доходят до углов губ), тяжелые, с широким основанием и закругленными концами, направленными к глазам, свисают по бокам го-

ловы вдоль щек, плотно прилегают к ним и покрыты длинной волнистой украшающей шерстью.

Недостатки: высокомерно поставленные, коротковатые уши.

Пороки: слишком короткие, с узким основанием или мятые уши (в складках или локоном, как у гончих).

Глаза миндалевидные, черные или темно-карие у черных, белых, серых и абрикосовых собак и темно-янтарные — у коричневых. Они низко (на уровне переносицы), широко и чуть косо поставлены, с жизнерадостным выражением. Веки сухие, плотно прилегающие, с пигментированными краями.

Недостатки: прямомерно поставленные, великоватые глаза.

Пороки: большие, круглые, выпуклые или свиные, прямомерно поставленные, светлые глаза или с красноватым оттенком, сырые, депигментированные веки, отсутствие волос вокруг глаз (очки).

Зубы средних размеров, крепкие, белые. Прикус ножницеобразный. Отсутствие одного из зубов — М1 или М2 верхней челюсти, М2 или М3 нижней челюсти, как и обоих Р1 — допускается.

Собака, не имеющая трех премоляров в комбинации: 3Р1 или 2Р1 и 1Р2, получает на ринге оценку «очень хорошо».

Недостатки: стертые не по возрасту зубы; наличие сломанных резцов, если это не мешает определению правильности прикуса, нерегулярное расположение резцов, желтые зубы после перенесенной чумы при сохранении прикуса и линейного расположения резцов, прямой прикус и тесный перекус, если они не нарушают внешнего вида морды.

Пороки: редкие, кариозные зубы, нерегулярное расположение резцов, перекус с отходом.

Шея средней длины, сильная, мускулистая, овального сечения, с красивой линией загривка, сухая, высоко поставленная, с гордо несущейся головой.

Недостатки: низкомерно поставленная, коротковатая или длинноватая, чуть сыроватая шея.

Пороки: низко поставленная, короткая, сырая, с подвесом шея.

Холка слабо выражена (высота собаки в холке чуть выше или равна высоте в крупе), переходит в прямую или слегка наклонную к крупу линию верха. **Лопатки** длинные, мускулистые, косо поставленные, плотно прилегают к спине.

Пороки: узкая, слабая или загруженная холка, свободные, отвесные или острые лопатки.

Спина крепкая, короткая, прямая или чуть наклонная к крупу, короткая и упругая.

Недостатки: мягковатая, слабоватая спина.

Пороки: слишком длинная или короткая, узкая, слабая, провисшая или горбатая спина.

Поясница короткая, мускулистая, крепкая, слегка выпуклая.

Недостатки: удлиненная, прямомерная, слабоватая поясница.

Пороки: длинная, узкая, слабая, провисшая или выпуклая поясница.

Круп округлый, мускулистый, умеренно скошенный.

Недостатки: слабоватый, прямомерный или скошенный круп.

Пороки: слишком длинный, узкий, резко скошенный или горизонтальный круп, высокозадость.

Хвост высоко поставлен, прямой, у курчавошерстных пуделей купирован на $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ от первоначальной длины, в движении и при возбуждении держится под углом 45° к линии спины.

Недостатки: низкомерно поставленный, некупированный хвост у курчавошерстных собак.

Пороки: закинутый над спиной, массивный, слишком тонкий или низко поставленный хвост, а у шнуровых пуделей — в кольцо.

Грудь глубокая (опущена до локтей), умеренно широкая ($\frac{2}{3}$ от глубины), овального сечения, с упругими ребрами. Окружность груди за локтями должна быть на 10 см больше высоты собаки в холке. Соколок груди слегка выступает за линию плечелопаточных сочленений.

Недостатки: широковатая, мелковатая, узковатая грудь.

Пороки: плоская, бочкообразная, мелкая, впалая или куриная грудь.

Живот умеренно подтянут, образует изящно изогнутую, плавную линию от груди к паху.

Недостатки: подтянутый или прямой живот.

Пороки: опущенный или поджарый живот.

Передние конечности. *Плечи* крепкие, мускулистые, наклонно поставленные, плечелопаточный угол 90—110°, длина плеча равна длине лопатки. *Локти* плотно прижаты к груди и направлены назад. *Предплечья* длинные, прямые, параллельные друг другу, с крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой. Длина предплечий $\frac{5}{9}$ от высоты собаки в холке. *Пясти* короткие, крепкие, почти отвесные.

Недостатки: слабый или перегруженный фронт, узковатый или широковатый постав конечностей, прямоватые или островатые плечи, чуть свободные локти, коротковатые или длинноватые предплечья, слабоватые пясти.

Пороки: те же отклонения, но выраженные в более сильной степени, низкопередость, искривленные предплечья.

Задние конечности. *Бедра* хорошо развитые, плотные, мускулистые, наклонные. Углы коленных и скакательных суставов хорошо выражены. *Голени* длинные, при осмотре сзади прямые и параллельные между собой. *Плюсны* крепкие, отвесные.

Недостатки: узковатый или широковатый постав, небольшая сближенность или вывернутость скакательных суставов, укороченные голени.

Пороки: слишком узкий, широкий, коровий, бочкообразный, саблистый постав конечностей, прямые углы сочленений, слабые плюсны, высокозадость.

Лапы небольшие, овальные, сводистые, в комке, перепончатые, подушечки крепкие, упругие, пигментированные, когти черные у черных и серых собак, черные или коричневые — у коричневых, у белых — светло-коричневые, у абрикосовых — темно-коричневые или черные.

Недостатки: слабоватые, плосковатые лапы.

Пороки: плоские, распущенные лапы, размет или косолапость, белые когти, светлые когти у абрикосовых собак.

Движения легкие, свободные, упругие, прямолинейные.

Недостатки: небольшие отклонения от прямолинейных движений конечностей.

Пороки: связанные, тяжелые, размашистые или плавные движения.

Дисквалифицирующие пороки

Крипторхизм, большие пуделя выше 62 см в холке, пятнистый окрас, включая «фантом» (черно- и коричнево-подпалый) и арлекин, белые пятна, белые волосы на лапах, неоднотонный чистый окрас, нетипичное строение головы, недокус, отсутствие любого резца или клыка, куцехвостость, прибылые пальцы или следы их удаления, отсутствие выставочного тримминга.

3

ВЫБОР ЩЕНКА

Прежде чем отправиться выбирать щенка, посетите общепородные и специализированные выставки, посмотрите на пуделей со стороны и переговорите с их владельцами и заводчиками. Не стесняйтесь задавать им вопросы, они с удовольствием поделятся с вами своими знаниями. Вы можете также обратиться за советом в национальный или региональный пудель-клуб, а также в близлежащий к вам клуб собаководства, где вам помогут разыскать заводчиков, имеющих пометы.

Тщательно изучите стандарт породы и лишь после этого свяжитесь с заводчиком и договоритесь с ним о встрече. Сообщите ему, какого размера, окраса и пола щенка вы хотите приобрести, а также с какой целью (просто для домашнего содержания, для участия в выставках или для использования в разведении), поскольку у него может не оказаться такого.

Большинство добросовестных заводчиков разводят пуделей для души, а не для наживы. Они с удовольствием покажут вам своих щенков и их мать, расскажут об их отце, покажут его фотографию или видеокассету с ним. Племенная работа должна вестись путем тщательного подбора и отбора племенных пар с учетом их экстерьера и происхождения.

Хороший заводчик заинтересован реализовать щенков в хорошие, заботливые руки, людям, которые будут не только с любовью заботиться о них, но и методично, разумно воспитывать, дрессировать и тренировать, не забывая о длительных прогулках и играх. Поэтому, когда вы придете осматривать помет, он забросает вас вопросами, интересуясь вашим образом жизни, привычками, увлечениями, семейным и материальным положением, возрастом ваших детей, если они у вас есть, а также наличием свободного времени, опытом по выращиванию и воспитанию собак и почему вы решили приобрести именно пуделя.

Самое главное, что вы должны выяснить у заводчика, — уравновешенный ли характер у разводимых им собак и присущи ли им лучшие качества пуделя.

Если вы решили договориться с заводчиком о встрече по телефону, обсудите с ним день и время, когда придете к нему, подробно расскажите, какого щенка вы хотели бы видеть, какой разновидности, пола и для чего — чтобы иметь спутника жизни, для ребенка, в качестве выставочной или племенной собаки.

При выборе щенка вы должны использовать полученные знания по стандарту породы и интуицию, а также уважать заводчика, с которым вам придется поддерживать дружественные отношения на протяжении всей жизни вашего питомца.

Вы можете выбрать из помета щенка, который пришелся вам по душе и отвечает всем вашим требованиям, но это вовсе не означает, что вы понравитесь ему. Чтобы этого не произошло, ваши темперамент, характер и привычки должны хотя бы частично совпадать. Так, если вы любите размеренный образ жизни, тишину и покой, не покупайте энергичного и жизнерадостного пуделя.

Если у вас есть маленькие дети, приобретайте не той-пуделя, а стандартного или миниатюрного пуделя, который сможет принять с ними более активное участие во многих играх и развлечениях. А если вы проживаете со старыми родителями, лучше купите тоя, а не щенка стандартного пуделя, способного сбить их с ног. В противном случае

вам лучше приобрести уже подросшую собаку в возрасте старше 1—1,5 лет, прошедшую курс послушания и пережившую «бурный» переходный период.

Выбирая ту или иную разновидность пуделя, следует учитывать также и конкретные условия вашего проживания. Стандартный пудель — крупная собака, нуждающаяся в хорошем моционе. Если вы слишком заняты на работе, не приобретайте пуделя этой разновидности.

Если вы решите самостоятельно выбрать щенка из помета, запомните следующее: выбирайте малыша, запавшего вам в душу, особенно если он желает быть в центре внимания, умеет поставить на место задиру, пристально и вдумчиво рассматривает вас своими искристыми глазами с лукавым взглядом, пытаясь заставить ваше сердце биться чаще. У него должны быть достаточно крепкие конечности, небольшие, овальные, сводистые, в комке лапы и хорошо развитый исследовательский инстинкт. Щенка не должны пугать посторонние шумы и звуки. Заслышав звук брошенной вами за его спиной связки ключей или внезапного хлопка в ладоши, он никак не должен реагировать на него или заинтересоваться, откуда он исходит. Если вы аккуратно возьмете малыша на руки (ни в коем случае не за шкуру и не за передние конечности, а подложив руку под живот), он будет сначала сопротивляться, пытаясь вырваться, затем успокоится, расслабится, обнюхает вашу руку или даже лизнет ее.

Большая часть заводчиков реализует пометы после достижения щенками четырехмесячного возраста или после их иммунизации от особо опасных заболеваний. Собравшись посетить питомник, никого не берите с собой, особенно детей, тогда, если вы не выберете в помете щенка, вы сможете посетить другой питомник или заводчика, чтобы найти именно то, что вам нужно. Чем больше пометов вам удастся осмотреть, тем больше вы узнаете о породе и о том, как должен выглядеть типичный щенок.

Правда, некоторые вещи сразу же бросаются в глаза. Это оживленность, энергичность, крепкое физическое и

психическое здоровье щенков и насколько правильные у них движения, ухоженные ли они и насколько хорошо выращены, нет ли у них истощения или ожирения, и содержатся ли малыши в чистоте. Если мать помета содержится в другой комнате или в вольере, попросите показать суку, чтобы вы смогли оценить ее, изучить характер и посмотреть, в каком состоянии она находится, а если вы уже выбрали щенка, то и решить, какой высоты в холке он сможет достигнуть. Только учтите, что оценившаяся сука, вскормившая помет, находится далеко не в самой лучшей своей кондиции.

Оценивая щенка, внимательно осмотрите его глаза. У только что прозревшего малыша они темно-голубые, а у трехнедельного и более взрослого — темно-карие, с черной окантовкой сухих, плотно прилегающих век (или в тон основному окрасу) и пигментированным третьим веком во внутренних углах глаз. При частичной или полной депигментации третьего века (оно в этом случае имеет белый или розовый цвет) взгляд пуделя становится пронзительным, как у орла.

Проверьте прикус, который должен быть ножницеобразным.

Не приобретайте пугливого, робкого, безынициативного или злобного и недоверчивого щенка.

Если малыш не реагирует на ваш приход, выясните у заводчика, в чем кроется причина такого поведения. Возможно, он только что поиграл или просто настало время отдыха, ведь маленькие щенки быстро устают, поэтому их жизнь состоит из еды, отправления естественных надобностей, игр и сна, который занимает большую часть времени суток, пока они не подрастут. Так что вы просто могли прийти не вовремя. В таком случае договоритесь с заводчиком о встрече в другое время.

При выборе щенка для выставок он должен полностью соответствовать стандарту, не имея видимых пороков, не говоря уже о дисквалифицирующих. У него должен быть характерный для пуделя ножницеобразный прикус, формат, приближающийся к квадратному, правильно сформированные пояса конечностей, должным образом купиро-

ванный хвост (в возрасте 3—7 дней) и свободные прямолинейные движения. Он не должен быть ни слишком растянутым, ни лещеватым.

Если щенок не соответствует вашим запросам, вкусу или характеру, вызывает жалость, сторонится однопометников, забивается в угол или со всех ног удирает от вас при вашем приближении к нему, не приобретайте его. Щенок должен вызывать восхищение своей жизнерадостностью, энергичностью, любознательностью, игривостью, то есть привлекать к себе внимание. Робость, граничащая с трусостью, указывает на нарушения темперамента. Вырастить из такого щенка преданного друга и любимца семьи вам вряд ли удастся. Не ударяйтесь в крайность и не выбирайте задиристого щенка, проигнорировав трусливого. Во всем должна быть золотая середина.

Учтите, что пудели коричневого, абрикосового и красного окрасов рождаются с шерстью густого темного окраса, который с возрастом перецветает. Пудели серебристого окраса рождаются преимущественно черными и, лишь перецветая, приобретают должный окрас. Если вас интересует пудель редкого окраса, знайте, что в возрасте 8—12 недель его окрас отличается от должного. Чтобы получить ясное представление о выбранном вами окрасе, вам следует тщательно изучить его на сформировавшейся взрослой собаке, а уж потом приобретать щенка.

И последнее, не приобретайте щенка, пока ему не исполнится 9 недель. В этом возрасте он чувствует себя вполне самостоятельным и независимым, поэтому безболезненно переносит разлуку с матерью и однопометниками и быстро адаптируется в новой семье.

После окончательного выбора заводчик должен предъявить вам копию родословной или обменную карточку щенка, которую вы поменяете затем на родословную, ветеринарный паспорт с отметкой о проведенных профилактических дегельминтизациях и прививках от особо опасных заболеваний собак, рекомендуемый на первое время рацион и моцион, свой телефон для консультаций с ним и телефон рекомендуемого ветеринара, хорошо знакомого с породой.

Если вы приобретаете щенка для выставок, кобель должен иметь в мошонке два хорошо развитых яичка. Осматривая малыша на одно- или двухсторонний крипторхизм (неопущение в мошонку из брюшной полости одного или обоих яичек), ан- или монорхизм (врожденное отсутствие одного или обоих яичек), наличие плавающего (то спускающегося в мошонку, то вновь поднимающегося в паховый канал) или зафиксированного в паховом канале яичка (из-за перекрута яичка или короткого семенного канатика), запомните, что даже у здоровой собаки яички расположены на разном уровне (как правило, левое впереди и чуть ниже правого), а при пальпации, как и на холоде, мошонка может сокращаться, а яички приподниматься в паховый канал. Кроме того, в некоторых семействах яички у кобелей спускаются в мошонку в более позднем возрасте (иногда после шестимесячного возраста). Собак с неопущением и полным отсутствием одного или обоих яичек не допускают к выставкам и разведению, но это вовсе не означает, что они не могут стать домашними питомцами и компаньонами и не способны участвовать в испытаниях и состязаниях.

Если вы приобретаете щенка для выставок с одним или двумя плавающими яичками, в контракте о покупке должно быть записано, что при выявлении у него истинного ан-, моно- или крипторхизма заводчик обменяет малыша на другого кобеля или вернет вам деньги.

Не планируя в будущем вязать и экспонировать собаку, натурализируйте щенка в препубертатном периоде: суку — до первой течки, а кобеля — до восьмимесячного возраста. Тем самым вы продлите ему жизнь и избавите от ряда заболеваний: сук — от пиометры (гнойного воспаления матки) и рака грудных желез и яичников, а кобелей — от рака предстательной железы и яичек.

Присмотрев одного-двух щенков в помете, сравните их между собой на столе, предварительно убедившись, что их лапы не будут скользить на нем. Приподнимите малыша за холку, слегка оторвав его передние лапы от стола, чтобы он мог поставить их в естественное положение. При этом щенок может слегка развернуть их кнаружи — не расстра-

ивайтесь, со временем он будет ставить их правильно, чтобы они смотрели строго вперед. Куда хуже, если у него ко-солапость, чего не должно быть.

Осмотрите щенка сбоку, чтобы оценить углы сочленений его конечностей и длину спины. Если вам кажется, что малыш растяннут, замерьте его высоту в холке и косую линию корпуса, после чего сравните полученные данные с форматом другого щенка. Судить о линии верха в этом возрасте практически невозможно, так как энергичные и неутомимые щенки не знают покоя и постоянно горбят или прогибают спину.

Как можно больше времени уделите наблюдению за играющими щенками. Обратите внимание на то, как они к вам приближаются. Не стоит покупать ни трусливого, ни нервного, ни бросающегося к вам вприпрыжку малыша, каким бы очаровательным он ни был. Лучше приобрести недоверчивого, но любопытного щенка, который сначала изучит вас со стороны, а лишь потом подойдет к вам.

Размер щенка не имеет большого значения, так как самый маленький малыш в помете может оказаться со временем крупнее своих собратьев.

Попросите заводчика показать вам копию родословной щенков. Почаще заходите к нему в гости, чтобы посмотреть на выбранного малыша, поиграть с ним и научиться ухаживать за ним.

Понаблюдайте за его играми во дворе и обратите внимание, встает ли он в естественную стойку, а если да, то как. Дело в том, что, если малыша что-то заинтересовало, он рефлекторно замирает в настороженной позе, предоставляя вам шанс оценить углы сочленений своих конечностей.

Огромное внимание следует уделить темпераменту и общительности щенков. Они должны самозабвенно играть друг с другом и с матерью, которая иногда рычит на досаждающего ей малыша или даже вынуждена хорошенько встряхнуть его за загривок, если он потерял контроль над собой, чтобы поставить на место и приучить к дисциплине.

Если хоть что-то в щенке вам не нравится, не покупайте его. Чудеса возможны, и из гадкого утенка может вырасти очаровательный лебедь, но, приобретая щенка с множеством пороков или недостатков, не стоит обманывать себя надеждой, что они исчезнут со временем.

Приобретая четырехмесячного малыша, учтите, что в этом возрасте большинство щенков пуделя напоминают гадкого утенка из-за своей угловатости, связанной с интенсивным и неравномерным ростом (то в длину, то вширь, то в высоту), поэтому выглядят непривлекательными. Кажется, что они состоят из одних только конечностей, суставов и мышц, напоминая несформировавшихся подростков.

В отличие от них, шестимесячные щенки выглядят более или менее гармонично сложенными. К этому возрасту у них сформировывается темперамент. Для его проверки резко хлопните в ладоши, бросьте связку ключей на пол, ударьте рукой по столу, только не испугайте щенка. Он должен замереть на месте. Если он социализирован, то должен быть общительным, дружелюбным и обладать личностными качествами, то есть высоко и горделиво держать голову, играть, всем интересоваться и озорничать.

Внимательно осмотрите щенка на столе. Обратите внимание на то, правильно ли у него поставлены уши, пропорционально ли развиты надбровные дуги и морда, сухие и плотно ли прилегающие у него веки, насколько сглажен или подчеркнут переход от лба к морде, правильно ли развиты челюсти, какой прикус, достаточно ли длинная и высоко ли поставленная шея и хорошо ли выражены углы сочленений конечностей. Его фронт в этом возрасте еще остается узким и выглядит прямым, лапы — овальные, нередко в небольшом размете, но со временем они будут смотреть строго вперед, линия верха — прямая и крепкая, а грудь еще не опустилась до локтей. Проверьте постав лопаток и локтей. Убедитесь, что круп не резко скошенный, а хвост — не низко поставленный.

Посмотрите на движения щенка спереди и сзади. Они должны быть прямолинейными, свободными и уверенными. Еще раз осмотрите малыша в естественной стойке.

Приобретая девятимесячного щенка, вы уже видите практически сформировавшуюся собаку квадратного формата, с пропорциональной корпусу длинной сухой головой, коренными зубами и должным прикусом. Если у щенка имеется перекус нижней челюсти, перекус или недокус, вы сразу заметите это, приподняв верхнюю губу.

Пудель в этом возрасте должен быть дружелюбным, энергичным, жизнерадостным, игривым и бдительным, проявляя сторожевые инстинкты.

Если вам нужна выставочная собака, ее лучше всего покупать именно в девятимесячном возрасте.

Запомните, идеальных пуделей нет, никогда не было и не будет. Любой из них имеет свои достоинства и недостатки, хотя каждый заводчик мечтает вывести собаку, максимально приближающуюся к стандарту — недостижимому эталону, к которому следует стремиться.

Не жалейте ни сил, ни времени в поисках выставочного щенка, а осматривая пометы, не спешите делать окончательный выбор, ведь вам предстоит приобрести спутника жизни, с которым придется прожить бок о бок не один год. Тщательно взвесьте все «за» и «против», тысячу раз спросите себя, готовы ли вы и ваши помощники взять на себя ответственность за будущего питомца. Ваш выбор должен быть хорошо продуманным и мудрым.

Купив щенка, вы получите ветеринарный паспорт щенка, заверенный ветеринаром, его родословную или обменную щенячью карточку.

Приобретя щенка, покажите его ветеринару, лучше всего это сделать в течение двух первых суток. Дело в том, что, если он выявит у него какие-то нарушения со стороны здоровья, вы сможете вернуть малыша заводчику (как правило, он сам посоветует вам исследовать питомца у врача сразу же после покупки).

Если вам нужен чисто домашний питомец и спутник жизни, но вы не хотите заниматься выращиванием щенка, подумайте о том, а не взять ли вам уже подрощенную собаку.

Щенки пуделя крайне забавные, комичные и непредсказуемые, невероятно экспрессивные, игривые, шаловливые и беззащитные. Попав в чужой дом, они быстро адаптируются в нем, счастливо приветствуя владельцев, издавая при этом радостные звуки, энергично размахивая хвостом, вертя крупом из стороны в сторону и улыбаясь. Да, он счастлив видеть вас, даже если вы вышли из комнаты всего на одну минуту. И все же не у всех есть время на выращивание щенка, его частое кормление, приучение к чистоплотности, обучение основным навыкам и хорошим манерам.

Кроме того, оставшись наедине с собой, без присмотра, малыш вполне способен перевернуть все в доме вверх ногами, обгрызть края мебели, испортить обивку, порвать книги, навалить кучу посреди комнаты или с удовольствием помочиться на ковер... Щенки крайне забавные и невероятно быстро постигают как хорошее, так и плохое (с нашей точки зрения). Раскрыть в них все лучшее и избежать закрепления ненужных нам привычек помогает обучение, совместные игры и прогулки, то есть постоянный контроль с нашей стороны. Но не у всех на это есть время. В этом случае лучше приобрести взрослую, уже воспитанную и обученную собаку.

Взрослый пудель или подросток быстрее адаптируется к новым условиям, чем маленький щенок, дольше может оставаться без выгула, соблюдая чистоту в доме, и уже через несколько недель начинает охранять его.

Присматриваясь к взрослому пуделю, проверьте, уравновешенный ли у него темперамент, понятлив ли он и послушен, насколько он жизнерадостный, игривый, энергичный и бдительный. Приласкайте и поиграйте с ним, проверяя, насколько легко он возбуждается, не проявляет ли робость, трусость или агрессию, охотно ли следует за вами и, вообще, рад ли он вашей встрече.

Внимательно изучите экстерьер избранного вами пуделя, осмотрите глаза, состояние шерстного и кожного покровов, конечности и движения.

Выйдите с ним на поводке на улицу и присмотритесь, не выпускает ли он вас из поля зрения, умеет ли ходить рядом и рад ли тому, что идет с вами.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РОДОСЛОВНОЙ

Родословная — генеалогическое древо собаки, включающее клички ее предков, как минимум, до четвертого колена. Сама по себе родословная ни о чем не говорит, если вы ничего не знаете о перечисленных в ней собаках. Поэтому, приобретая щенка или взрослую собаку, постарайтесь как можно больше узнать у заводчика или владельцев пуделей о происхождении выбранного вами питомца.

Если в родословной все предки вашей собаки принадлежали к одной породе, значит, она чистопородная. По родословной можно вычислить коэффициент инбридинга, если он был, и выяснить, из какой линии разведения вышел ваш питомец, использовался ли при этом бэк-кросс, межлинейный кросс или ауткросс.

Учтите, что наличие у вашего питомца родословной говорит лишь о его происхождении, а не о том, что он яркий представитель породы.

КОРОТКО ОБ ОКРАСАХ

Пудель должен иметь чистый однотонный окрас, желательно без примеси седых волос в шерсти, равномерно пигментированную серую кожу, более темную на морде, и пигментированные в тон основному окрасу мочку носа, края век, губ и когти. Если учесть, что порода вышла из крупных водяных собак с охотничьими качествами ретриверов, становится понятным требование к однотонной расцветке, так как такие собаки, замершие в напряженной стойке, сливаются с тенью болотистой низины и камышей, становясь

незаметными для дичи, но хорошо видны охотнику на фоне серебристой воды. Кроме того, пудель равномерного однотонного окраса напряженного тона выглядит привлекательнее и наряднее пятнистого. Только не следует забывать, что должная расцветка пуделя должна сочетаться с породным типом, правильным экстерьером, уравновешенным темпераментом с подвижным типом нервной деятельности и соответствующими движениями.

Иссиня-черная расцветка пуделя говорит о присутствии в его генотипе доминантного гена черного окраса, подавляющего проявление любого другого цвета. Как и у собак коричневого окраса, он может находиться в комбинации с рецессивным геном раннего посеждения, приводящего к появлению окраса типа «гризли». Следует учитывать, что этот нежелательный окрас может быть не врожденным, а приобретенным из-за влияния факторов окружающей среды, например избытка в корме ионов железа, недостатка йода в питьевой воде или приема антибиотиков. Временное осветление окраса у сук может наблюдаться во время течки и щенности, а появление ржавого налета на шерсти — при длительном нахождении собаки на солнце.

Темно-серая (стальная) и, ее разновидность, голубая (светло-серая, или серебристая) расцветки обусловлены действием генов-модификаторов и гена-ослабителя черного окраса. Причем щенки серебристого и серого окрасов рождаются черными, реже с мышастым оттенком, перецветая к возрасту 5—7 недель и приобретая окончательный окрас к 1,5 годам. Учтите, что с возрастом светло-серые собаки могут стать устрично-белыми, что недопустимо. Собак серого и голубого окрасов не следует вязать с коричневыми, белыми из-под цветных, абрикосовыми и кремовыми пуделями.

Коричневый окрас (с печеночной пигментацией мочки носа, краев век, губ и когтей) имеет множество вариантов оттенков, связанных с комбинированным действием генов, включая и гены-модификаторы, отвечающих за окрас волоса, а также ген-ослабитель окраса и ген раннего посеждения, но FCI отдает предпочтение лишь темному

красно-коричневому (красному или махагоновому) и шоколадному, а не коричнево-серебристому, кофе с молоком (бежевый, желтовато-коричневый или цвета хаки) или серебристо-бежевому (с темно-коричневой пигментацией мочки носа, краев век, губ и когтей).

Светло-кремовая расцветка с возрастом может осветляться до устрично-белой, что крайне нежелательно.

Абрикосовый (апельсиновый или оранжевый) окрас должен быть цвета кураги с черной как смоль пигментацией мочки носа, краев век, губ и когтей. Крайне обидно, но с возрастом шерсть собак этого окраса нередко осветляется до кремового, светло-кремового и даже до практически белого цвета. Кроме того, в жилах этих собак нередко текут крови пуделей пятнистого окраса, что может привести к рождению арлекинов или щенков двухцветной масти.

Белый пудель должен иметь серебристую или пятнистую пигментацию кожи, особенно темную на морде, черную мочку носа, черные края век и когти, в противном случае он будет лейцистом.

4

ЩЕНОК В ДОМЕ

Прежде чем покупать щенка, приобретите для него клетку. Это может быть будка, клетка с металлической сеткой, вольер, специальный контейнер (сборный или стационарный), включая фибергласовый, для транспортировки собак (на выставку, состязания, испытания, для визита к ветеринару, на вязку или просто во время отдыха). Ее устанавливают на улице или в доме. В продаже имеются клетки промышленного производства разных размеров и стоимости. Она должна быть такого размера, чтобы взрослый пудель мог не только свободно стоять и поворачиваться в ней, но и распластаться. Пока щенок маленький, половину клетки можно чем-нибудь завесить, чтобы он чувствовал себя в ней спокойно и комфортно. Со временем она станет его логовом, в котором он сможет уединиться от всех, чтобы отдохнуть или поспать. Оставив малыша в закрытой клетке, вы можете со спокойной душой уйти из дому, зная, что с ним ничего не случится, а ваша мебель и вещи не пострадают от его зубов, особенно во время их смены. Кроме того, клетка поможет приучить щенка к чистоплотности, ведь малыши никогда не гадят там, где столуются и спят. Другими словами, она защитит его от неприятностей, постоянно угрожающих вездесущим, любопытным и озорным щенкам пуделей.

Как только вы принесли щенка в свой дом, поместите его в отведенную ему легко моющуюся и убирающуюся комнату, пока он не адаптируется и не научится чистоплотности, чтобы познакомиться со всей квартирой.

Оставьте на время его одного, закрыв в фибергласовом контейнере или клетке, застелив пол ковриком с оставленным на нем запахом матери и однопометников и предоставив свободный доступ к свежей питьевой воде. Не реагируйте на жалобно-призывный скулеж — щенок скоро успокоится и перестанет плакать. В противном случае он лишь научится управлять вами, жалобно скуля и требуя выполнения любых своих желаний. Клетка или прочный манеж не позволят ему испытать клаустрофобии или фрустрации, стать замкнутым и непрерывно лаять без всякого на то повода.

Решив оставить малыша без присмотра, убедитесь, что в комнате ничто не угрожает его жизни, а дверь плотно закрыта. Спрячьте электрические провода, уберите ядовитые вещества и растения, любые вещи, которые любопытный щенок может попробовать на зуб и проглотить.

Не бойтесь запира́ть малыша в клетке или контейнере для транспортировки на время, пока вас не будет в доме, из страха ограничить его свободу и чувство собственного достоинства. Наоборот, в ней он научится чистоплотности и будет чувствовать себя более спокойно и уверенно, легче перенося одиночество и не испытывая страха в просторной комнате, а вы будете спокойны за его безопасность и не будете переживать, что он что-нибудь натворит в ваше отсутствие.

Клетки или контейнер пригодятся вам и для безопасной транспортировки вашего питомца, иначе он будет мешать вам вести машину, может испачкать сиденье или выпрыгнуть на ходу из салона.

Щенок должен чувствовать себя в клетке в полной безопасности, уютно и комфортно. На дно следует постелить мягкую, легко моющуюся подстилку и положить излюбленную игрушку щенка.

Никогда не используйте клетку для наказания, иначе ваш щенок возненавидит ее и найдет себе для сна и отды-

ха другое место, например кресло, диван или вашу кровать. Он должен с удовольствием входить в нее сам или по вашей команде «Клетка!», не испытывая страха перед ней. Она должна быть его логовом, но не более того. При этом ваши дети должны знать, что, если собака отправилась в клетку, ей не следует докучать.

Теперь поговорим о такой важной для щенка вещи, как игрушка. Ее роль, как и для младенца, познающего мир, крайне велика, особенно во время смены молочных зубов на постоянные, для обучения аппортировке и сброса накопившейся энергии. Покупая игрушки своему малышу, учтите, что они должны быть безопасными для него и легко моющимися. Они не должны полностью помещаться в пасти щенка, иметь острые края и пищалку. В противном случае щенок без труда может разгрызть их, а в худшем — проглотить оторванный кусок или пищалку, что может привести к непроходимости пищевода и смерти от удушья, к перекруту желудка или кишечной непроходимости, также смертельно опасным для его жизни.

Съедобные игрушки из сыромятной кожи, в отличие от съедобных нейлоновых, следует давать только под строгим наблюдением, чтобы вовремя заметить, что собака отгрызла слишком большой кусок, застрявший в горле, и вовремя прийти ей на помощь, не дожидаясь, пока она погибнет от удушья.

Заметив, что ваш малыш порвал игрушку, сразу же выбросите ее, купив взамен новую.

5

**ПРОФИЛАКТИКА ВЕДУЩИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ**

Вы должны научиться наблюдать за своим питомцем и улавливать происходящие в нем перемены, чтобы в случае заболевания вовремя прийти на помощь. Никогда не забывайте о том, что вы отвечаете за здоровье своего питомца.

К профилактическим мероприятиям относятся первичная вакцинация с ежегодной ревакцинацией от особо опасных заболеваний собак, борьба с экзо- и эндопаразитами, рациональное питание, регулярный тренинг и периодическое обследование собаки ветеринаром.

Купив щенка, сначала покажите его ветеринару, а уж потом несите домой. В крайнем случае это нужно сделать в первые три дня. Если вы поедете в ветлечебницу на машине, посадите малыша в клетку или в контейнер для транспортировки, чтобы обезопасить его жизнь (в случае резкого торможения или автоаварии) и сохранить сиденье чистым (если у щенка разовьется транспортная болезнь). Не забудьте захватить ветеринарный паспорт щенка, если заводчик вам его дал, и коробочку с калом для анализа на наличие в нем яиц глистов. Ожидая в лечебнице своей очереди, во избежание случайного заражения держите малыша на коленях или в клетке, не позволяя ему обнюхивать других собак и играть на полу.

Боясь уколов, не показывайте это малышу, ведь ваше переживание или страх легко передаются ему. Ваше отношение к прививкам должно быть хладнокровным, а к ветеринару — дружеским, тогда малыш, завидя шприц или почувствовав укол иглы, не будет сопротивляться, кусаться и выть на всю лечебницу от страха. Пока ветеринар осматривает малыша, приободрите его, разговаривая с ним спокойным, ласковым голосом, а если потребуется, то крепко придержите питомца, чтобы он не вырывался и не мешал врачу.

Щенок, не прошедший иммунизации, не может общаться с соплеменниками и покидать дом, а привитый — должен пройти трехнедельный поствакцинальный карантин, так как является условно больным и заразным для других собак.

Впервые щенка прививают до смены зубов. При этом не следует забывать, что пудель, выросший на материнском молоке, имеет колостральный иммунитет примерно до двухмесячного возраста. Поэтому первая иммунизация проводится, как правило, в возрасте 2,5 месяца. Кроме того, щенок может быть внутриутробно, через молоко матери или слюну укусившей его блохи, спрыгнувшей с нее, заразиться яйцами и личинками глистов. Поэтому, купив щенка и принеся домой, ему нужно дать адаптироваться к новой обстановке, а дня через три провести дегельминтизацию (независимо от того, что заводчик проводил ее, когда вашему малышу исполнилось 18, а затем и 28 дней). После этого вам следует сдать его кал на анализ для выявления яиц глистов и в течение трех дней осматривать испражнения малыша на наличие в них зрелых глистов. Не следует забывать и о том, что это следует делать не менее двух раз в год (если щенок живет в частном доме, то максимум четыре раза, а если вывозится на длительный срок на дачу, то до и после ее посещения), а также за 10 дней до профилактической иммунизации. Дело в том, что прививки можно делать только абсолютно здоровым собакам.

Как это ни прискорбно, но мне часто приходится слышать от владельцев следующие возражения против ис-

следования кала своего питомца на яйца глистов и проведения ему профилактической дегельминтизации: «Но ведь заводчик уже травил ему глисты», «У моего щенка нет глистов, иначе бы я их увидел», «Да откуда у моего малыша глисты, ведь он еще ни разу не был на улице?». Все они забывают о том, что их питомцы могут быть инфицированы глистами не только у заводчика, но и в их собственном доме. Ведь не по воздуху же они попадают в свою квартиру. Так что на их обуви, одежде и даже на руках вполне могут оказаться яйца глистов. Второе, что они не учитывают, что глист — кишечный паразит, питающийся кровью или химусом, находящимся в кишечнике щенка. Пока малыш здоров, у глиста нет никаких причин покидать его тело.

Если ветеринар обнаружил у малыша яйца или личинки глистов, а вы — половозрелых особей, он назначит лекарство, наиболее пагубно действующее на выявленный им вид. Через 10 дней ему вновь нужно будет дать лекарство и снова сдать кал на наличие яиц глистов. Щенок считается здоровым, если ветеринар дважды не найдет в его кале личинок и яиц глистов. Запомните, прежде чем давать щенку лекарство, вам следует его взвесить, так как любой медицинский препарат дается строго по весу.

Итак, вернемся к иммунизации. Впервые щенок должен быть привит в возрасте около 2,5 месяца (некоторые заводчики делают своим месячным щенкам инъекцию противокорревого гаммаглобулина, так как вирусы кори и чумы плотоядных имеют одну природу). Лучше проводить комплексную иммунизацию поливалентной сывороткой сразу от 3—4 и даже 5 особо опасных заболеваний собак: чумы плотоядных, парвовирусного гастроэнтерита, гепатита собак, лептоспироза и парагриппа. Если в вашем доме (питомнике) проживают другие собаки, то через 3 недели проводится ревакцинация. После смены резцов и клыков, приводящей к падению (смыванию) иммунитета, а также появления самых мелких зубов за нижними клыками — первых премоляров, вновь нужно провести ревакцинацию. Последующая ревакцинация проводится через год от первой, после чего последующие

профилактические иммунизации выполняются ежегодно с интервалом в 10—12 месяцев.

Вы четко должны знать, какую вакцину использовал ваш ветеринар, с каким сроком годности, какого числа и месяца ввел ее и какую схему ревакцинаций рекомендовал. Не следует думать, что взрослая собака менее подвержена заболеваниям, чем щенок. Это не так. Мало того, начиная с пятилетнего возраста собака становится менее резистентной к заболеваниям, как и щенок.

На ампуле с вакциной могут быть написаны разные латинские буквы, обозначающие то или иное заболевание собак. Так, буква «D» означает, что вы имеете дело с вакциной от чумы плотоядных (D — distemper), «H» — от инфекционного гепатита собак (H — hepatite), «L» — от лептоспироза (L — leptospirosis), «P» — от парвовирусной инфекции собак (P — parvovirus), «Pi» — от парагриппа (Pi — parainfluenza), «R» — от бешенства (R — rabies).

ОСОБО ОПАСНЫЕ ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Чума плотоядных

Чума плотоядных — острая или подострая контагиозная вирусная болезнь, проявляющаяся лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек, поражениями кожи, ЦНС или сочетанием этих признаков. Возбудитель — РНК-содержащий вирус, имеющий антигенное и иммунологическое родство с вирусом кори человека. Впервые вирус описан в 1905 году Карре и назван его именем.

Чуме плотоядных наиболее подвержен молодняк — щенки до годовалого возраста. Взрослые собаки болеют редко, чаще после шестилетнего возраста.

Вирус сохраняет контагиозность на протяжении 10—51 дня, причем переболевшие собаки могут выделять его в течение трех месяцев после клинического выздоровления. Заражение происходит преимущественно воздушно-капельным (через органы дыхания) и алиментарным (с

пищей) путями. Факторами передачи вируса считаются инфицированные предметы ухода за больными животными, насекомые и птицы. Грызуны являются вирусоносителями. Болезнь возникает в любое время года.

В кожной перхоти вирус обнаруживается на пятый, а в легочной ткани — на десятый день после заражения.

Существенную роль в патогенезе чумы играют возбудители секундарных (вторичных) и смешанных инфекций: сальмонеллы, эшерихии, кокки и другие. Они, а также гельминтозы, стресс-факторы, нарушения в кормлении, содержании и разведении снижают иммунологическую резистентность (сопротивляемость) макроорганизма, усиливают тяжесть патологических процессов и увеличивают летальность.

Инкубационный (скрытый) период у собак составляет 14—21 день и более. В зависимости от степени выраженности клинических признаков различают легочную, кишечную, нервную, кожную, смешанную и abortивную форму болезни, которая может протекать остро, подостро и хронически.

При *остром течении* отмечаются увеличение температуры до 41—42 °С, потеря аппетита, коматозное состояние и гибель животного на 2—3 сутки.

Подострое течение у щенков 1—1,5-месячного возраста протекает без повышения температуры. В остальных случаях она повышается на 1—2 дня, после чего становится ремитирующей или нормальной. Сначала у собаки отмечаются депрессия, пугливость, мышечная дрожь и снижение аппетита, на 2—3-й день — поражение слизистых, пустулезная сыпь на коже, кашель, тахикардия, запоры, сменяющиеся приступами рвоты, упорными слизисто-кровяными поносами со зловонным запахом, судорожным синдромом, эпилептиками, парезами или параличами.

Хроническое течение свойственно нервной форме заболевания.

Abortивное течение длится 1—2 дня и сопровождается недомоганием.

Диагноз ставится на основании 6 критериев: поражение органов дыхания, диарея, катар слизистых оболочек глаз и

носа, гиперкератоз подушечек лап, поражения ЦНС, продолжительность болезни не менее трех недель. Если любые четыре симптома замечены у собаки, значит, она больна чумой плотоядных.

На раннем этапе заболевания имеют значение четыре признака: кашель, фотофобия (светобоязнь), повышение температуры тела (39 °С и более) при потере аппетита (или нормальная температура при булимии) и симптомы поражения нервной системы. Причем по двум признакам можно заподозрить чуму, а по трем — поставить диагноз.

После переболевания чумой животное приобретает пожизненный иммунитет.

Профилактика заболевания заключается в своевременной профилактической вакцинации против чумы. Поствакцинальный иммунитет сохраняется при этом не менее года.

Если мать вакцинирована в течение года, то ее щенки в более чем 90% случаев невосприимчивы к чуме до 28-дневного возраста. К двухмесячному возрасту половина или чуть более из них может заболеть, а к пятимесячному — большинство.

Если вы заподозрили, что ваш щенок заразился чумой, немедленно покажите его ветеринару, чтобы он вовремя успел ввести ему сыворотку и иммуномодуляторы.

Инфекционный гепатит, или болезнь Рубарта

Инфекционный гепатит собак (собачий аденовироз) протекает также, как и гепатит у людей за исключением того, что больной человек может заразить собаку, а она его — нет. Заражение происходит при контакте с больным животным через инфицированную слюну, кал и мочу, а также трансмиссивно. Возбудитель — ДНК-содержащий вирус. Наибольшую восприимчивость к вирусу имеет 1,5—6-месячные щенки. Собаки старше 3 лет заболевают редко.

Заболевание протекает с лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек органов дыхания и пищева-

рительного тракта, поражением печени и ЦНС. Переохлаждение, перегревание, неполноценное кормление, а также секундарные инфекции (сальмонеллез, колибактериоз, токсоплазмоз, стрептококкоз, чума) и гельминтозы активизируют латентное течение гепатита, приводя к клиническому проявлению болезни.

Через 2—3 суток от момента заболевания вирус появляется в крови, особенно в капиллярах и венах печени и селезенки.

Инкубационный период при спонтанном гепатите у собак составляет 6—9 дней.

Различают молниеносное, острое, хроническое и латентное течение.

При *молниеносном течении* болезни отмечают угнетение, потерю аппетита, жажду, рвоту с примесью желчи, диарею, повышение температуры до 40,5—41,7 °С, увеличение подчелюстных лимфоузлов, конъюнктивит со слезотечением, ринит, слабость задних конечностей, увеличение печени. На 6—10-й день мутнеет роговица. В редких случаях отмечаются петехии (точечные кровоизлияния), иктеричность склер (пожелтение белков глаз), отеки подкожной клетчатки, судороги и параличи.

Хроническое течение характерно для взрослых собак. При этом отмечаются исхудание животного, ремитирующая лихорадка, анемия, гастроэнтерит, отечность подкожной клетчатки, флегмоны в области головы и конечностей, а также некрозы мышц. Больные суки abortируют или рожают нежизнеспособное потомство.

Латентное (скрытое) течение — выделение вирусов без признаков заболевания. Переболевшие собаки приобретают пожизненный иммунитет, хотя в течение некоторого времени могут выделять вирус. У подсосных щенков из-под иммунных матерей возникает колостральный иммунитет.

Болезнь быстро прогрессирует и часто приводит к смертельному исходу. Поэтому, заподозрив ее у своего питомца, немедленно покажите его ветеринару, чтобы он смог ему помочь.

Лептоспироз

Лептоспироз — инфекционная, природно-очаговая болезнь, вызываемая спирохетами, переносчиками которых, как правило, служат крысы и дикие утки. Поэтому заражение происходит при контакте с ними или через зараженную ими еду и воду. Вирус в воде рек и озер сохраняется до 200 дней. Особую опасность представляют невысыхающие лужи, пруды, болота, медленно текущие речки и влажная почва.

Лептоспиры проникают в организм животных и человека через поврежденные участки кожи, слизистые оболочки рта и носа, глаз, половых путей и желудочно-кишечного тракта. *Инкубационный период* колеблется от 3—5 до 14—20 дней.

Лептоспироз протекает остро (иногда молниеносно), подостро, хронически и атипично.

Уже через 5—6 минут лептоспиры встречаются в крови, минуя лимфоузлы. С 3—5-го дня болезни в крови содержатся антитела, благодаря которым уже через неделю возбудитель исчезает из организма.

Эндотоксины лептоспир вызывают анемию, паренхиматозную желтуху, гемоглобинурию и даже появление эритроцитов в моче, из-за чего она приобретает темно-желтый или коричневый цвет и выделяется малыми порциями.

Кроме того, заболевание характеризуется кратковременной лихорадкой, угнетением, отказом от корма, изъязвлением слизистой оболочки полости рта, увеличением паховых и шейных лимфоузлов, рвотой, сильной жаждой, атонией желудочно-кишечного тракта с запорами или с кровавыми поносами (чаще), абортами, маститами, рождением нежизнеспособного потомства. В большинстве случаев аборт наступает через 2—5 недель после заражения суки. Плоды, инфицированные на второй стадии перинатального периода, выживают, так как продуцируют собственные антитела.

Лептоспиры долго живут в почках, так как защищены от действия иммуноглобулинов.

В крови реконвалесцентов длительно сохраняются иммунные комплексы, вызывающие аутоиммунные процессы: нарушения функции сердечно-сосудистой системы, почек, печени, ЦНС и других органов.

Так как при этом заболевании быстро нарастают симптомы печеночной и почечной недостаточности, лечение должно начинаться при появлении первых же симптомов — крови в моче, частом мочеиспускании. Поскольку лептоспирозом может заразиться и человек, то при уходе за больной собакой следует строго соблюдать все меры предосторожности.

Парвовирус

Течение парвовируса зависит от возбудителя, которым может быть парво- и коронавирус. Первый пагубно действует на желудочно-кишечный тракт, а второй — на сердце, красный костный мозг и лимфоузлы. Заболевание быстро распространяется от одной собаки к другой через инфицированный кал и легко переносится на лапах и подошвах нашей обуви.

Щенки с парвовирусным миокардитом часто внезапно умирают на первый или второй день после заражения. У небольшой части выздоровевших малышей развивается хроническая сердечная недостаточность.

Степень тяжести заболевания зависит от физического состояния собаки — одни из них тяжело переносят его, в то время как другие лишь на пару дней теряют аппетит.

Парагрипп

Парагрипп — инфекционный трахеобронхит питомниковых собак, распространяющийся воздушно-капельным путем.

У собаки появляется хронический кашель, трудно поддающийся лечению. Несмотря на это, она выглядит абсолютно здоровой.

Привитые животные переболевают в легкой форме, щенки — намного тяжелее взрослых.

Больных щенков следует держать в теплом, влажном помещении до полного выздоровления.

Бешенство

Бешенство — смертельная, остропротекающая болезнь, опасная для всех теплокровных животных и человека. Оно характеризуется передачей возбудителя через укус и признаками диссеминированного полиоэнцефаломиелита. Резервуаром вируса бешенства являются дикие хищные животные, собаки, белки, скунсы, лисы, летучие мыши, кошки, еноты и так далее.

Различают эпизоотии городского и природного типов.

Инкубационный период варьируется в пределах от нескольких дней до года и более, но чаще всего составляет 3—6 недель.

Болезнь, как правило, протекает остро, проявляясь в буйной или тихой форме.

При *буйной форме* различают три стадии заболевания: продромальную, стадию возбуждения и стадию параличей. Начальная стадия продолжается от 12 часов до трех суток, сопровождаясь следующими симптомами: либо собака становится скучной, угнетенной, забивается в темные углы и неохотно идет на зов хозяина, либо она проявляет чрезмерную привязанность к владельцу, следуя за ним по пятам, и усиленно вылизывает его руки или лицо. Беспокойство и возбудимость собаки постоянно нарастают. Она начинает всего бояться, пугаться шума и прикосновений. У нее могут быть вербальные и зрительные галлюцинации. В этом случае собака начинает «ловить мух» и лаять на незнакомые предметы. Иногда у нее извращается аппетит (она начинает есть кал и грызть несъедобные предметы) и развивается зуд кожных покровов. В конце продромального периода у собаки отмечаются затруднение глотания (из-за пареза мышц глотки), слюноотечение и хриплый лай, переходящий в вой, а также

нарастание необоснованной агрессии (она начинает кусаться без всякого повода). Эта стадия возбуждения длится 3—4 дня. У собаки исчезает чувство страха, она молча бросается на людей. Приступы буйства, длящиеся несколько часов, переходят в угнетение. Часто отмечаются судороги. Любое раздражение усиливает буйство. Развивается афония, отвисание нижней челюсти, косоглазие. Стадия параличей длится 1—4 дня.

При *тихой форме* бешенства (при заражении собак от лисиц) первым признаком заболевания служат затруднение глотания и слюнотечение. Затем отвисает нижняя челюсть и развиваются параличи, а через 2—4 дня собака погибает.

Атипичная форма характеризуется подострым течением, прогрессирующим похуданием, признаками гастроэнтерита и поздним развитием параличей. Иногда отмечают только истощение.

Еще реже регистрируют *абортное течение* болезни, завершающееся выздоровлением, и возвратное бешенство.

В случае укуса больной собакой (или животным) вам следует немедленно обратиться в травмпункт.

Прививки от бешенства могут предотвратить это смертельное заболевание. Ветеринары делают их отдельно от остальных прививок начиная с трехмесячного возраста с обязательными ежегодными ревакцинациями.

ЭКЗОПАРАЗИТЫ

Блохи, лесные и зудневые клещи (саркоптоидные), вызывающие саркоптоз, или зудневую чесотку плотоядных, в частности собак, включая накожных, в число которых входят хориоптоидные, вызывающие хориоптоз (кожеедную, или ножную чесотку), а также ушные, приводящие к отодектозу (ушной, или головной чесотке), и подкожных (обуславливающих развитие демодекоза, протекающего без зуда). Инфестация наиболее часто происходит весной и осенью, когда много жухлой травы и от длинношерстных собак.

Особую опасность для людей и собак представляют болезнь Лайма, передающаяся через укусы клещей, и клещевой энцефалит.

Чтобы избежать нападения клещей, воспользуйтесь препаратом от них, рекомендованным вашим ветеринаром.

Отодектоз

Ушные клещи, живущие в ушном канале, раздражают чувствительные уши пуделя, вызывая безудержный зуд. В результате их жизнедеятельности в ушном канале можно обнаружить скопления сухого секрета ржаво-коричневого или даже черного цвета. В большинстве случаев пудели заражаются от кошек, реже инфицируются клещом, видоспецифичным для собак. Никогда не пытайтесь лечить отит у своего питомца самостоятельно, так как воспалительные процессы микробной, грибковой и клещевой природы лечатся по-разному. Использовать противоклещевые и противогрибковые ушные препараты можно лишь после того, как ветеринар выявит грибок или ушных клещей. В противном случае вы можете перевести острый процесс в хронический, трудно поддающийся лечению и характеризующийся частыми обострениями.

Саркоптозы животных (зудневая чесотка)

Вызывается видоспецифичными клещами рода *Sarcoptes*, в частности *S. canis*.

Излюбленная локализация клещей — кожа ушей, локтей, скакательных суставов и морды. На этих участках часто наблюдается выпадение волос и струпья. Зачастую имеются небольшие красные пятна, зуд — это укусы насекомых. Струпья на концах ушей, наряду с интенсивным зудом, дают возможность поставить почти точный диагноз. Если вы потрете край уха собаки между двумя пальцами, она будет расчесывать именно это место.

Позже, вследствие расчесывания и растирания зудящих от укусов мест, кожа на них лопается и из раневой поверхности начинает сочиться тканевая жидкость. Заметны корочки, струпья и даже комочки выпавших волос. В последней стадии заболевания кожа становится плотной и темнопигментированной.

Диагноз ставят на основании исследования соскобов кожи под микроскопом или, в трудных случаях, биопсии кожи (выявление клещей *Sarcoptic Mange*).

Вероятно, ни одно кожное заболевание не заставит вашу собаку расчесывать и кусаться так яростно. Интенсивный зуд вызывается самками-клещами, проникающими на несколько миллиметров под кожу для кладки яиц. Через 3—10 дней из яиц вылупляются личинки, которые, созревая, начинают откладывать собственные яйца. Весь цикл развития составляет 17—21 день.

Если у вашей собаки чесотка, а у вас появился зуд кожи, значит, клещи перешли к вам. Однако они не паразитируют на человеческой коже более трех недель.

Демодекоз

Демодекоз, фолликулярная чесотка, или железница, — разновидность чесотки, вызываемая видоспецифичными эндопаразитическими клещами рода *Demodex* семейства *Demodecidae* подотряда *Trombidiformes* отряда *Acariformes*. У собак это *D. canis* (жизнеспособность до 7 суток), болеют также кошки и грызуны. Болезнь может протекать в скрытой (латентной), чешуйчатой (сквамозной) и пустулезной (пиодемодекоз) формах. В первом случае зуда не будет. Вне зависимости от этого вы увидите на шерсти головы, спины, боках и шеи небольшие, круглые, как бы изъеденные молью пятна. В ювенильном возрасте такая картина наблюдается у молодых собак после перенесенного ими стресса. У некоторых сук может появиться одна-две залысины при наступлении первой в их жизни течки. На вооружении у ветеринара имеются препараты, способствующие восстановлению шерсти и общему вы-

здоровлению, но если ваша собака перенесла генерализованную форму зудневой чесотки (с поражением фолликулов волос на всем теле), ее следует исключить из разведения, чтобы спасти будущий помет от внутриутробного заражения.

Отрубевидная чесотка (блуждающая чесотка)

Этот тип чесотки характерен для щенков и чрезвычайно заразен. Возбудитель — большой красноватый клещ *Cheyletiella Mange*, который имеет тенденцию распространяться в помещениях для собак. Он паразитирует на поверхности кожи, преимущественно на шее и спине, вызывая сильный зуд после укуса, и без хозяина быстро погибает.

Диагноз ставят в случае обнаружения клеща на щенке или в соскобе, собранном на бумагу и исследованном под микроскопом.

Нотоэдроз

Зудневая чесотка плотоядных, вызываемая клещами рода *Notoedres*, точнее, *N. cati*, паразитирующими на голове. Иногда отмечают генерализованную форму нотоэдроза.

Заболевание характеризуется изменением кожных покровов вокруг глаз, носа и на наружной поверхности ушных раковин. Шерсть на этих участках выпадает, отмечается сильный зуд.

Лингватуллез

Вызывают паукообразные из рода *Linguatulla* (*Pentostomida*). Проявляются они поражением органов дыхания и паренхиматозных органов.

В половозрелой форме их обнаруживают в носовой полости змей, собак и человека. Личинки и нимфы развива-

ются в паренхиматозных органах и лимфоузлах травоядных животных. Промежуточный хозяин необязателен.

Собаки теряют чутье, аппетит снижается, развивается истощение. Иногда отмечают нервные явления, напоминающие бешенство, или манежные движения. В отдельных случаях паразит виден через носовое отверстие.

Не меньшие неприятности доставляют пуделям мухи, слепни, оводы, мокрецы, мошки, кровососки и комары, власоеды и блохи.

Пухоеды и власоеды

Это стационарные эктопаразиты из отряда Mallophaga. Пухоедов известно 2500—3000 видов. На млекопитающих, кроме свиней, обитают представители семейства Trichodectidae, а на собаках — Trichodectes canis.

Пухоеды кормятся перхотью, волосами, роговым слоем кожи, струпьями и кровью, но не сосут ее, а «едят», глотая капельки крови, вытекающие из ранок. На людях они не паразитируют. Имеется около 3000 представителей отряда пухоедов и 60 видов власоедов.

У насекомоядных, летучих мышей, грызунов, зайцев, свиней, тюленей власоедов не бывает.

При паразитировании отмечается зудящий дерматоз с выпадением волос. Излюбленная локализация: шея, корень хвоста, конечности и подгрудок.

Блохи (*Suctoria*)

Блохи — обособленный и молодой по происхождению отряд насекомых. Их эволюционный возраст, как и вшей, составляет около 65 миллионов лет. В природе насчитывается приблизительно 1100 видов блох.

Блохи — временные видоспецифичные паразиты, нападающие на различных животных и человека с целью крово-

сосания. В патологии животных они играют роль гематофагов — хранителей и переносчиков возбудителей инфекционных и инвазионных болезней. Блохи объединены в отряд Siphonaptera (Aphaniptera) семейств Pulicidae, Sarcopsyllidae, Vermipsyllidae и других. В России имеется 30 родов, около 90 видов блох. Кровь сосут и самцы, и самки. Несмотря ни на что, человеческая блоха легко дрессируется!

На собаках паразитируют *C. canis* Curt. (собачья блоха), прокормильцами которой являются плотоядные, грызуны и человек, *C. felis* Bouche (кошачья блоха), правда, при наличии поблизости кошек они питаются и размножаются на них, и *Pulex irritans* L. (человеческая, или обыкновенная, блоха), обитающая на человеке, собаке, кошке и свиньях.

Блохи способны длительно голодать. Цикл развития личинок составляет 3—60 дней. Они ведут сапрозойный образ жизни. В среднем блоха живет 3—4 месяца.

Блохи вызывают зудящие дерматозы, являясь переносчиками бацилл, риккетсий и других возбудителей с зараженных чумой или иными инфекционными болезнями грызунов. Песчаные блохи (*Sarcopsylla penetrans*, вредная блоха, джиггер, или тунга) часто нападают на животных и человека. Их самки внедряются в кожу головой, обычно под ногтями рук или ног или между пальцами, где и откладывают яйца. Кожа в этих местах воспаляется, а после изъязвления из раны выходят яйца. Попутно в организме хозяина может развиваться столбняк или гангрена. Излюбленная локализация: область межчелюстного пространства, верхняя часть шеи и живот.

Обычная кошачья блоха (*Ctenocephalides felis*) — основная причина поражения кожи у собак. Все собаки страдают от ее укусов, за исключением живущих в горах, так как блохи не живут выше 1500 м над уровнем моря. У животных, обитающих в помещениях, они встречаются круглый год. Блохи питаются кровью. У многих собак их укусы вызывают лишь незначительный зуд, но у части может развиться тяжелая аллергия на слюну и фекалии блох, а тяжелая инвазия ими может привести к анемии и даже смерти.

Заражение блохами выявляется при обнаружении на шерсти собаки крупинки черного цвета, похожих на соль

или перец. Эти крупинки — яйца и фекалии блох. Фекалии состоят из переваренной крови. Если их стряхнуть на влажную белую бумагу, они выглядят красновато-коричневыми.

Излюбленные места блох — спина собаки, область вокруг хвоста и круп, иногда паховая область. На этих участках собака испытывает наиболее сильный зуд.

Взрослая блоха — мелкое, темно-коричневое насекомое, которое можно увидеть невооруженным глазом. У блохи нет крыльев, и она не может летать, зато имеет мощные задние лапки и прыгает на огромное расстояние. Блохи очень быстро передвигаются, поэтому их трудно поймать, в отличие от клещей и вшей.

Жизненный цикл блохи. Для размножения блохе нужна теплая и влажная среда обитания. Чем выше температура и влажность, тем выше ее жизнеспособность. Блохи спариваются на коже собаки. За свой жизненный цикл самка откладывает 2000 яиц, которые созревают под мебелью, в коврах, трещинах пола, в постельном белье. Через несколько дней из яиц выходят личинки, которые кормятся на местном мусоре. Они прядут кокон и превращаются в куколок. В идеальных условиях, при 70% влажности и температуре окружающей среды в 18—27 °С, взрослые блохи могут оставаться в стадии куколок в течение нескольких месяцев. После выхода из куколки блоха ищет хозяина. Если она его не находит, то может прожить в течение 4—12 месяцев без еды.

Около 1% популяции блох состоит из взрослых особей, 99% остаются на стадии яиц, личинок и куколок. Прежде чем уничтожать блох на собаке, необходимо одновременно избавиться от них в помещении, где она содержится.

ДРУГИЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Стригущий лишай

Это грибковое заболевание кожи, которым собаки чаще всего заражаются от кошек или с кустов, через которые те прошли. Оно проявляется в появлении небольших круглых,

точнее блюдцеобразных, пятен с сухой корочкой. Сами по себе они не беспокоят собаку, но, если она случайно расчесет их или оцарапает, они могут воспалиться и привести к появлению зуда. Заболевание легко лечится фунгицидными препаратами.

Воспаление параанальных желез

Около наружного отверстия прямой кишки, под кожей, примерно на четырех и восьми часах условного циферблата, расположены анальные железы, выполняющие в норме несколько функций — их секрет смягчает прохождение каловых масс во время дефекации, а выделяемые при этом феромоны сообщают соплеменникам о поле собаки, ее индивидуальных особенностях, настроении, положении на социальной лестнице и занимаемой ею территории. При нерациональном или неправильном кормлении, например слишком мягкой и жидкой пищей, анальные железы переполняются секретом и могут воспалиться вследствие закупорки выходных протоков. В этом случае в вышеуказанных местах отмечается припухлость мягких тканей и гипертермия кожи. Собака испытывает напряжение и зуд в области анального отверстия, из-за чего начинает «кататься на салазках». Она часто кружится на месте, пытаясь схватить себя за хвост, и часто вылизывает анальную область. Нередко у собаки отмечается выпадение волос у корня хвоста. Кожа в этом месте краснеет и чешется, из-за чего вы можете обнаружить следы расчесов.

При воспалении и закупорке параанальных желез их следует прочистить, после чего перевести собаку на рациональное кормление. Для прочистки желез поднимите левой рукой хвост собаки и придержите его. Возьмите в правую руку чистую салфетку, положите большой и указательный пальцы по бокам заднепроходного отверстия на четырех и восьми часах и сблизьте их, сдавливая мягкие ткани. Если параанальные железы опорожнились, выбросив под давлением на салфетку струю зловонного секрета коричневатого цвета, собака перестанет «кататься на

салазках». Наличие крови или гноя в секрете — признаки воспаления. В этом случае собаку следует показать ветеринару.

Аллергии

Аллергическая реакция — нежелательная повышенная чувствительность иммунной системы. У собаки может проявиться аллергическая реакция на различные вещества: пыльцу растений, плесень, домашнюю пыль, укусы насекомых, определенную пищу, лекарства и химикаты. Контакт с ними вызывает зуд, чихание, кашель, слезотечение, рвоту или диарею.

Аллергическую реакцию может вызвать повторный контакт собаки с аллергеном, на который организм отвечает гиперсенситивной (повышенной) реакцией. Около 10% собак бурно реагируют на аллергены (развиваются аллергические реакции немедленного типа) — это так называемая атопическая аллергия, передающаяся по наследству.

Существует два вида реакции повышенной чувствительности: немедленного типа, которая проявляется в течение нескольких минут после контакта и часто вызывает крапивницу и зуд, и замедленного типа, при которой зуд появляется спустя несколько часов или даже дней. Анафилактический шок — пример аллергической реакции немедленного типа. Аллергия является основной причиной заболевания кожи у собак.

Крапивница (уртикария)

Крапивница, или крапивная лихорадка, — аллергическая реакция немедленного типа. Она характеризуется внезапным появлением выпуклых, округлых, зудящих волдырей на коже, особенно вокруг морды, слипанием волос в области небольших бляшек и отеком век. Крапивница обычно появляется в пределах 30 минут после экспозиции и исчезает через 24 часа. Наиболее часто к ней приводят укусы насекомых, особенно блох. Она может

развиваться после вакцинации, приема антибиотиков, после поедания испорченного мяса (бактериальная аллергия) или некоторых продуктов питания (пищевая аллергия). Другими причинами могут быть попадание инсектицидов и мыла на кожу.

Дыхательная аллергия (атопический дерматит собак)

Если собака расчесывается в одно и то же время года, причиной может быть кожная аллергия, обусловленная вдыханием пыльцы растений (она сходна с сенной лихорадкой у людей). Дыхательная аллергия характеризуется сильным зудом, который часто сопровождается облизыванием мочки носа, расчесыванием морды о ковер, чиханием, слезотечением и подвертыванием лап.

Аллергический дерматит обычно начинается у собак в возрасте 1—3 лет и носит наследственный характер.

Первые признаки аллергии появляются в августе и сентябре. В марте и апреле она повторяется из-за пыльцы трав. Вследствие развивающейся гиперсенсibilизации организма собака начинает реагировать на шерсть, домашнюю пыль, плесень, перья птиц, растительный пух и другие аллергены. Из-за множества аллергенов заболевание теряет сезонность и зависимость от времени года.

Пищевая (алиментарная) аллергия

Пищевая аллергия сопровождается зудом кожи и может протекать как реакция немедленного, так и замедленного типа. Она встречается у собак в любое время года и на разные продукты питания — на мясо, молоко, яйца, рыбу, зерновые, картофель, бобы, сою и т. д. Для ее развития должен быть предварительный контакт с нежелательным кормом. Часто собаку в течение ряда месяцев и лет кормят одним и тем же, что и приводит к гиперсенсibilизации организма на данный продукт.

Наряду с зудом на коже появляются папулы, пустулы и волдыри, особенно в области крестца, живота и задней поверхности конечностей. Первоначально кожа краснеет,

а со временем становится толстой и гиперпигментированной. Сыпь не специфична. Пищевой дерматит может проявляться и в поражении мочки носа. Так как пищевая аллергия наблюдается редко, бывает, что ее ошибочно принимают за контактный дерматит.

Аллергический дерматит на слюну и фекалии блох

У определенного процента собак возникает аллергия на слюну от укуса блох. Появление сыпи — это реакция повышенной чувствительности организма, которая может протекать как по немедленному, так и по замедленному типу. Зуд развивается даже после выведения блох и сопровождается появлением красных, похожих на пустулы узелков. Особенно сильный зуд отмечается в области хвоста, на задней поверхности конечностей и внутренней поверхности бедер. Пустулы могут покрыться струпьями и инфицироваться. Собаки при этом часто трутся обо что-нибудь. Позже кожа становится плотной и пигментированной, а волосы выпадают. Если блохи вовремя не обнаружены, зуд усиливается.

Контактный и аллергический контактный дерматит

Это два отдельных заболевания, сопровождающихся одинаковыми клиническими признаками и появляющихся после контакта с химикатами в виде реакции на коже. Некоторые химикаты вызывают реакцию только у собак с повышенной чувствительностью, другие — после частого соприкосновения с аллергеном.

Контактный дерматит любого типа сопровождается появлением красных узелков наряду с покраснением и воспалением кожи. Заметны влажные, мокнущие пятна, струпья, пузыри, изъязвления, гнойные выделения из них.

К наиболее широко распространенным контактными раздражителям относятся кислоты, щелочи, инсектициды, детергенты (синтетические моющие средства), растворители, мыла и нефтепродукты, а к контактными аллергенами — пудра и ошейники от блох, пластиковая и резиновая посуда и ковровые красители.

Контактный дерматит обоих типов встречается преимущественно на лапах, подбородке, животе, в паховой области и на мошонке (безволосых участках тела). Участки тела, на которых лежат собаки, поражаются тоже. Аллергия на ошейник от блох проявляется локальным (местным) зудом и покраснением кожи, выпадением волос, изъязвлением кожи и образованием струпьев под ошейником. Заболевание может распространяться и на другие участки тела.

Гипотиреоз

Гипотиреоз — результат пониженной секреции гормона щитовидной железы. Недостаточность функции железы приводит к выпадению шерсти, появлению залысин. Волосы становятся грубыми, ломкими, легко выпадают. Кожа становится толстой, плотной и темноокрашенной. Наиболее часто поражаются шея и тело.

Поскольку щитовидная железа влияет на обмен веществ, недостаточность гормона замедляет процессы образования энергии. У собаки недостаточность функции щитовидной железы проявляется следующими симптомами: вялость, апатия, заторможенность, ожирение, веки опущены, задержка умственного развития, нерегулярные течки. Эти признаки развиваются постепенно, и проходит немало времени, пока они проявятся. Заподозрить заболевание можно только в связи с бесплодием животного.

Гипертиреоз

Гиперфункция коры надпочечников заключается в повышенном синтезе кортизона, что встречается крайне редко. Избыток кортизона воздействует на шерстяной покров: наблюдается выпадение волос на симметричных участках тела с потемнением кожи. Участки головы и шеи не поражаются так сильно, как при недостаточности функции щитовидной железы. Это важный фактор различия.

Гиперэстрогенемия

Избыток женского полового гормона встречается как у кобелей, так и у сук. Заболевание встречается редко. У сук это связано с образованием кисты яичников, которые вырабатывают слишком много эстрогена. В результате развиваются бесплодие, ложная беременность, увеличение сосков и вульвы. У кобеля развивается опухоль семенников. Появляется избыток серы в ушах. Шерсть симметрично выпадает по бокам и на животе. Кожа в паху и подмышечной ямке становится плотной и тугой (как у свиньи).

Гипоэстрогенемия

Это легкое заболевание кожи, встречающееся у взрослых сук с удаленными в раннем возрасте яичниками. Наблюдается медленный рост волос на нижней части живота и вокруг вульвы, позднее в этот процесс вовлекается нижняя часть грудной клетки и шеи. Кожа становится нежной, гладкой и почти безволосой. Суки очень спокойные, ласковые, любвеобильны и даже навязчивы.

Аденома третьего века

Это воспаление слезной железы третьего века (чаще всего аутоиммунной природы), расположенной во внутреннем углу глаза. Мелкие мышцевидные волокна, пронизывающие ее, недостаточно крепкие, чтобы удерживать воспалившуюся железу на месте. Во внутреннем углу глаза появляется припухлость розового или красного цвета.

Белые угри

Закупорка мейбомиевых желез чаще всего наблюдается у собак с белой шерстью. Заболевание протекает легко. На свободном краю века появляется несколько крупных белых угрей — это скопление секрета железы.

Блефарит

Блефарит — воспаление краев век, которые уплотняются, краснеют и воспаляются. Наиболее часто встречается у щенков, сопровождаясь скоплением струпьев и гноем, прилипающим к краям век.

Стафилококковый блефарит приводит к образованию белых пустул (гнойничков) по краям век. Гнойнички вскрываются, вызывая зуд и покраснение кожи. Зачастую отмечается увеличение лимфатических узлов на шее.

Дермоид (дермоидная киста)

Это кистовидное, одно- или многокамерное образование, содержащее жироподобное вещество с примесью волос.

Дермоидная киста обычно встречается около наружного угла глаза и содержит волосяные фолликулы. Часто волосы вырастают из поверхности самого глаза. Это доброкачественное образование, которое необходимо удалить, так как оно вызывает постоянное раздражение глаза.

Дистихиаз

Дистихиаз — врожденное заболевание, при котором отмечается дополнительный ряд ресниц, растущих из края век и трущихся о роговицу, что вызывает раздражение глаза. Оно может быть легким, осложняясь у собак в зрелом возрасте.

Лишние ресницы выжигают электроножом или удаляют хирургическим способом.

Коричневые подтеки внутреннего угла глаза («глаз пуделя»)

В большинстве случаев этиология заболевания неизвестна (если не учитывать плохой гигиенический уход за глазами). Считают, что причиной являются воспалительные

процессы горла, например хронический тонзиллит, откуда инфекция проникает в слезный проток, вызывая его рубцевание, или небольшой внутренний угол глаза, что приводит к переполнению слезного озера, слезящимся глазам и появлению коричневых пятен. Синдром слезящегося глаза может являться следствием раздражения глаза и непроходимости носослезного протока. Поэтому, прежде чем использовать лекарственные препараты и косметические средства, необходимо тщательно обследовать слезоотводящие пути. Если не выявлено специфических заболеваний, то назначают антибиотики широкого спектра действия (например, тетрациклинового ряда). Если же выявлен очаг хронической инфекции, например в глотке или слезной системе, то для его устранения используют антибиотики в сочетании с устранением хронического очага и закупорки каналов. В этом случае используются тетрациклины, так как они выводятся слезными железами, обесцвечивая красящее соединение слезной жидкости и коричневые подтеки. Тетрациклин обычно принимается в течение трех недель (не более).

Хирургическое вмешательство является методом выбора. Удаляют слезную железу третьего века, что ведет к снижению секреции слез и расширению слезного озера во внутреннем угле глаза.

Энтропия

При этом дефекте верхнее веко (одно или оба) заворачивается внутрь и ресницы раздражают роговицу. От постоянного трения возникает эрозия роговицы, а со временем появляются язвы. Если оставить все как есть, язвы могут перфорироваться, приводя к слепоте.

Обычно признаки энтропии, от умеренной до тяжелой, появляются у щенка в период между двухнедельным возрастом, когда открываются глаза, и четырнадцатью месяцами. Щенки часто демонстрируют признаки заболевания, растирая глаза или морду лапами.

Эпифора

Это непрерывное слезотечение (глаз на слезе). В этом случае водянистые или слизистые выделения из глаз переполняют веки, стекая по бокам морды, образуя подтеки. Постоянное увлажнение кожи в месте стекания слез вызывает ее воспаление и зачастую инфицирование, что ведет к затруднению зрения и изменению поведения. При данном заболевании слезотечение не связано с эмоциональными причинами, а вызвано препятствием в отводящих слезу путях или увеличенным выделением слезы. Собаки не плачут, как люди. Причины, вызывающие развитие эпифоры, могут быть следующими: раздражающие заболевания век, энтропион (завертывание ребра века или части века внутрь к глазу), различные формы конъюнктивита, инородные тела, язвы роговицы и передний ювениит. В этих случаях имеет место повышенная секреция слез как защитная функция на воспалительную реакцию болезненного глаза. Другие причины рассмотрены ниже.

Нарушение оттока слезы (носослезная окклюзия) — слезотечение без явной причины, при этом секреция количества слез может быть нормальной. Это может быть при нарушении оттока слез, связанном с разными причинами, например врожденное сужение или непроходимость (окклюзия) одного из протоков век, собирающих слезы во внутренних углах глаза, рубцовое сужение этих протоков или их отверстия, например после гнойного конъюнктивита, острое воспаление протоков или основного носослезного протока, что вызывает их непроходимость продуктами распада клеток, инородное тело, например семена луговых трав.

«Ячмень» (*folliculitis ciliarum* — гордеолум, или мейбомит)

«Ячмень» — образование «красного кармана» по краю века, связанного с воспалением и закупоркой протока сальных желез ресниц — мейбомиевых желез, вырабатывающих

маслянистое вещество, защищающее глаза от высыхания и трения век, а также от избытка слезной жидкости и инородных тел.

Для ускорения созревания «ячменя» используют горячий компресс, хотя он может вскрыться и самостоятельно. В большинстве случаев «ячмень» прокалывают маленькой стерильной иглой. Затем накладывают мазь с антибиотиками (неоспорин, гелиомициновая, эритромициновая и другие).

Хронический блефарит, при котором в процесс вовлекаются слезные железы век, наблюдается у взрослых собак.

Лечение включает применение антибиотиков, кортизона и горячих компрессов.

Повреждение роговицы

При поверхностной травме роговицы выздоровление наступает через 1—2 дня. Более крупные и глубокие повреждения требуют для заживления более длительного времени. Повреждение роговицы нельзя вылечить, пока имеется инородное тело в одном из век. Соответственно во всех случаях, за исключением легких, необходимо исключить наличие инородного тела на внутренней поверхности век (включая третье). Раннее их распознавание и удаление способствует быстрому выздоровлению.

В запущенных случаях развивается изъязвление роговицы или ее воспаление (кератит).

Васкулярный или пигментный кератит

Состояние глаза, при котором отмечается прорастание кровеносных сосудов и/или образование пигмента на поверхности глаза. Отложение пигмента является конечным результатом длительного раздражения этого участка глаза, например при эктропии.

Катаракта

Это заболевание характеризуется помутнением хрусталика. В некоторых случаях катаракта ясно видна невооруженным глазом в виде белесых комочков, придающих хрусталику молочно-серую или голубовато-белую испещренность за зрачком. Катаракта наблюдается в любом возрасте, но наиболее характерна для собак после 5 лет. По внешнему виду хрусталика невозможно сказать, врожденная она или приобретенная. Чаще всего она связана с наследственной предрасположенностью.

Зачастую катаракта развивается у собак с сахарным диабетом.

Прогрессивная атрофия сетчатки

Заболевание заключается в гибели клеток сетчатки, что ведет к необратимой потере зрения.

Оно наиболее часто встречается у собак 5—7 лет, начинаясь с потери сумеречного зрения (куриной слепоты). Такие собаки плохо ориентируются в темноте, боятся находиться в темной комнате (клаустрофобия), могут лаять на знакомые предметы, боятся спрыгивать с кровати. С ухудшением зрения собака в темноте может путать направление движения, пойти в совершенно другую сторону. Отмечается и ряд других поведенческих расстройств. Заболевание развивается постепенно и заканчивается полной утратой зрения.

Центральная прогрессивная атрофия сетчатки (центральный хориоидит).

В основе заболевания — повреждение пигментных клеток в центральной части сетчатки.

В первую очередь погибает центральная часть сетчатки, то есть область наилучшего видения, поэтому собака видит предметы размытыми, хотя способность видеть движущиеся объекты у нее сохраняется (за счет периферии сетчатки).

Гингивит

Зубной камень — первичная причина гингивита. Ввиду того, что воспаление десны — признак периодонтита и угрожающего гниения зубов, ее нельзя игнорировать.

При воспалении десен у собаки отмечаются покрасневшие, болезненные и опухшие десны, которые кровоточат, если их потереть. Позже края десен отходят от зубов, появляются карманы и трещины. Попадающая в них пища вызывает инфекцию по ходу десен (при надавливании из-под них выходит гной).

Признаки легкого гингивита: кровотечение по краю десен (когда трут десны или чистят зубы собаке) и дурной запах изо рта.

При ухудшении состояния собака теряет аппетит, с трудом захватывает корм, иногда отмечается слюнотечение.

Гипертрофический гингивит

Десны разрастаются вдоль или над зубами. В результате они травмируются, инфицируются, препятствуя гигиеническому уходу. Разрастания десны можно удалить хирургическим путем.

Эпулис — форма гипертрофического гингивита, когда часть десны разрастается, образуя массу в виде цветной капусты на ножке. Такие доброкачественные опухоли часто наблюдаются у пуделей и бульдогов. Они мешают смыканию зубов, когда собака закрывает рот. Большие эпулисы следует удалять для поддержания хорошего гигиенического ухода.

Кардиомиопатия

Это заболевание связано с поражением мышц сердца, когда воспаление и рубцевание вызывают увеличение сердца и расширение его камер. Наконец мышца истончается и у собак развивается застойная сердечная недостаточность.

В большинстве случаев причина заболевания неизвестна (идеопатическая кардиомиопатия), но наиболее характерна для пуделей, особенно для кобелей среднего возраста.

Первые признаки заболевания: необъяснимая вялость, потеря веса, кашель, быстрая утомляемость при тренинге, редкое дыхание. Аритмии сердца вызывают обмороки, дальнейшую потерю веса и другие быстро нарастающие признаки сердечной недостаточности. Встречается острая кардиомиопатия, быстро приводящая к смерти. В редких случаях удается выявить причину заболевания, которой могут быть предшествующая инфекция, гипотиреоз и диабет. Болезнь Лайма (кардит Лайма) распознается более часто как потенциальная причина вторичного миокардита.

Дисплазия локтевого сустава

Это заболевание наследственного происхождения вызывается одним или несколькими факторами: несращение локтевого бугра с отростком локтевой кости, фрагментированный венечный отросток локтевого сустава и несращение надмыщелков плечевой кости. Два отдельных состояния наблюдаются у очень крупных пород. Все три связаны с нарушением процесса окостенения и приводят к несостоятельности локтевого сустава и к дегенеративным изменениям в нем. Подвижные костные фрагменты или расщелочивание и отслойка хряща в локтевом суставе выступают в качестве раздражителя или износа.

Щенки начинают хромать на переднюю конечность в возрасте около 6 месяцев. Некоторые щадят, не наступают на нее, другие хромают только на рыси. Характерно, что локоть развернут кнаружи от грудной клетки.

Рахитоподобное состояние

Рахит (называемый остеомалацией у взрослых, или английской болезнью) вызывается недостатком витамина D₃. Ввиду того что этот витамин способствует всасыванию кальция

и фосфора в кишечнике, одновременно может иметь место и их недостаточность. Это редкое заболевание у собак. В большинстве случаев, классифицируемых как рахит, вероятно, имеет место вторичный гиперпаратиреоз, связанный с неправильным питанием.

Симптомы: характерное расширение суставов в месте соединения ребер с грудиной (рахитические четки); бочкообразный постав конечностей и другие нарушения роста щенка, наряду с переломами у взрослых собак представляют собой известные, но тяжелые случаи.

Гипервитаминоз

Некоторые люди полагают, что быстро растущим щенкам необходимы добавки в виде витаминов и минералов для поддержания нормального роста, для построения крепкой кости. Современные промышленные корма для собак учитывают их рост и развитие и содержат необходимые витамины и минеральные вещества. Избыток их вреден. Рост и развитие ухудшаются, так как собака не может усваивать избыток кальция, фосфора и витамина D. Обильное кормление и избыток витаминов вызывают нарушения в кости аналогично гипертрофической остеодистрофии.

Витамины и добавки кальция способствуют быстрому росту щенков в том случае, если они получают несбалансированное питание. При любых сомнениях обратитесь к ветврачу.

Кисты (*жировик или стеатома, липома или жировая киста*)

Жировики довольно часто встречаются у собак. Они могут появляться на любом участке тела. У некоторых пород они наблюдаются гораздо чаще, чем у других. Жировая киста состоит из плотной капсулы, окружающей ретинированную сальную железу, представляющей собой сырное веще-

ство — себум (жировой секрет сальных желез — кожное сало). Она может разрастись до 2,5 см, после чего, как правило, инфицируется и вскрывается. Содержимое кисты дренируется, что ведет к самовыздоровлению. Большинство кист следует удалять.

Бородавки и папилломы

Бородавки не так часто встречаются у собак, как у людей, и более характерны для взрослых собак. Это доброкачественное новообразование эпидермиса и папиллярного слоя кожи.

Папилломы являются доброкачественными эпителиальными опухолями кожи и слизистых оболочек. Кожные папилломы образуются за счет разрастания роговых клеток кожи. Некоторые из них имеют у основания ножку, другие — нет. Их необходимо удалять, особенно если они мешают (периодически повреждаются) или начинают кровоточить.

Липомы

Это опухоль (как правило, доброкачественная), развивающаяся из жировой ткани (зрелых жировых клеток) и окруженная фиброзной капсулой. Она округлой формы, гладкая, мягкая, жироподобной консистенции (не путайте с гноем). Липомы растут медленно, могут вырастать до нескольких сантиметров в диаметре (более 2,5 см). Развивается независимо от пола, но чаще наблюдается у ожирелых собак (особенно сук).

Опухоли яичек

Опухоли яичек встречаются довольно часто и характеризуются увеличением размеров яичек или их ткани. В большинстве случаев они наблюдаются при одно- или двух-

стороннем крипторхизме. В этом случае опухоль обнаруживается в паховом канале. В большинстве случаев опухоли яичек не дают метастазов.

Опухоли клеток Лейдига (лейдигомы) небольшие и не имеют большого значения. Опухоли клеток Сертоли (сертолиомы) секретируют эстроген и приводят к феминизации кобеля (развитию по женскому типу) — увеличению грудных желез, отвисанию крайней плоти, двустороннему симметричному выпадению волос. Гиперэстрогенемия приводит к угнетению костного мозга и анемии.

Оба вида опухолей протекают доброкачественно.

Семинома (дисгерминома) является наиболее частой опухолью яичка, очень злокачественна и рано дает метастазы.

Лечение заключается в удалении яичка (если опухоль не злокачественная). После кастрации признаки феминизации обычно исчезают через 2—3 месяца.

Опухоли вульвы и влагалища

Опухоли половой системы наиболее часто наблюдаются в области вульвы и влагалища. Эти опухоли встречаются у стареющих неразвязанных сук. Большинство из них доброкачественные, но они могут расти, превращаясь в большие, вызывая деформацию промежности. Опухоли влагалища, особенно растущие внутрь, могут привести к непроходимости родового канала, что приводит к тяжелым или несостоятельным родам.

Трансмиссивная венерическая опухоль (TVT) — злокачественное заболевание, наблюдаемое независимо от пола и передающееся половым путем. Опухоль появляется на вульве, в пределах влагалища или на половом члене кобеля в течение недели после вязки. Эти опухоли напоминают цветную капусту и растут до 2,54 см. 50% из них самостоятельно регрессируют через 3—6 месяцев.

Опухоли яичников

Гранулезоклеточные опухоли (большой частью доброкачественные) могут сохранять способность к выработке эстрогена, приводя к гиперэстринизму — нарушению эстрального цикла, увеличению вульвы и абсцессу матки (пиометре).

Аденокарцинома — это злокачественная опухоль яичников. Как правило, наблюдается у сук после 8 лет.

Опухоли грудной железы

После течки или ложной беременности грудные железы могут остаться увеличенными или припухшими. В этом случае, если надавить на грудь, вы увидите желтоватую, иногда молочную жидкость. Это так называемая гиперплазия молочной железы, вызванная гормональным дисбалансом. Данное состояние наиболее характерно для старых сук, никогда не имевших щенков, и сук, не вязавшихся какое-то время. Гиперплазии молочной железы не бывает у сук с удаленными яичниками. Данное состояние может самостоятельно пройти через 1—2 месяца. Если же оно сохраняется, могут развиваться опухоли грудной железы или осложнения со стороны яичников.

Из опухолей грудной железы наиболее часто встречаются новообразования, около 50% из них приходится на злокачественные, а 50% — на доброкачественные аденомы. Наиболее часто поражаются половые железы (около петли). Основные признаки включают болезненное увеличение или уплотнение в железе. В большинстве случаев заболевание наблюдается у сук после 10 лет.

Рак груди — высокозлокачественная, быстро метастазирующая, гормонально зависимая опухоль. Метастазы в большинстве случаев наблюдаются в легких (особенно в верхних долях и средостении).

Опухоли костей

У пуделей встречаются как доброкачественные, так и злокачественные опухоли костей. Наиболее часто встречается злокачественная опухоль — остеосаркома, которая может развиваться в любом возрасте, но чаще наблюдается у кобелей.

Длинные трубчатые кости конечностей — наиболее характерная локализация остеосаркомы. Заболевание начинается с появления беспричинной хромоты. Часто на этот признак не обращают внимания до тех пор, пока опухоль не станет заметной. Надавливание на припухлость вызывает боль.

Хондросаркома — вторая из наиболее известных злокачественных опухолей костей, наблюдающаяся у пуделей после 6 лет. Излюбленная локализация опухоли: ребра, кости носа и таза. Это большая, плотная, болезненная опухоль, растущая между костью и хрящом. Эта опухоль также дает метастазы в легкие, но менее агрессивна, чем остеосаркома.

Дисплазия тазобедренного сустава

Дисплазия тазобедренного сустава — нарушение соответствия суставных поверхностей друг другу одного или обоих тазобедренных суставов из-за костно-хрящевых изменений в ацетабулярной впадине подвздошной кости и головке бедра, приводящих к нестабильности сустава, подвывиху или вывиху головки бедренной кости, проявляющихся в прихрамывании, хромоте или невозможности опоры на тазовую конечность. Первые признаки дисплазии, как правило, проявляются в момент интенсивного роста щенка, то есть в возрасте 6—8 месяцев. Правда, их можно спровоцировать. Такими факторами служат нерациональное кормление, дефицит в пище витаминов D_2 и D_3 , ожирение и сверхповышенные нагрузки на тазовые конечности. Болезнь может иметь разное течение и степень тяжести. Так, иногда собака с тяжелой формой дисплазии может чувствовать себя совершенно здоровой, а с легкой — инвалидом.

Заболевание развивается постепенно и начинается с появления неуверенной походки и чувства дискомфорта. Затем собака начинает хромать на одну из задних конечностей, но болезнь прогрессирует, и через какое-то время она уже перестает наступать на нее. Диагноз дисплазии тазобедренного сустава ставится собаке на основании ряда рентгенограмм, выполненных при строго определенных укладках и под анестезией. Сама по себе дисплазия неизлечима, хотя для устранения болевого синдрома нередко используется оперативное лечение, а для восстановления функции сустава и опороспособности конечности — крайне дорогостоящий атродез (замена больного сустава на искусственный).

Собаки, использующиеся в разведении или планирующие для участия в племенной работе, обязаны пройти рентгенологическое обследование тазобедренных (и локтевых) суставов для исключения у них дисплазии, а при ее выявлении — исключены из разведения.

6

**ГРУМИНГ¹, КОРМЛЕНИЕ,
СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ТРЕНИНГ****ГРУМИНГ**

Повседневный уход за пуделем должен стать особым событием и для владельца, и для собаки. Для этого вам следует приобрести стол для груминга. Щенку или уже взрослой собаке нужно внушить, что груминг — серьезная процедура, а не игра. Ухаживать за пуделем следует аккуратно, не причиняя боли, чтобы он получал удовольствие от груминга и тесного общения с вами.

На выставках мы замираем в восторге, видя пуделей разных размеров и окрасов, идеально подстриженных и красивых. То же самое чувство испытываешь в парке или на площади, столкнувшись с владельцем, выгуливающим пуделя с очаровательной любительской стрижкой. Крайне обидно видеть на улице неухоженного пуделя, владелец которого не вправе называться собаководом.

Многим владельцам пуделей кажется, что они никогда не освоят искусство стрижки своих собак. И действительно, груминг — подлинное искусство, и далеко не каждому удастся добиться такого же совершенства, каким

отличаются профессиональные грумеры. Специалистам по грумингу и триммингу (удаление отмерших волос, как покровных, так и подшерстка, и придание собаке стандартных форм и ухоженного вида путем выщипывания, вычесывания и подстригания) известно, как следует ухаживать и следить за волосами, чтобы добиться должной структуры шерсти, прежде чем понадобится взять в руки ножницы и приступить к стрижке. Основную часть таких процедур вы вполне можете проделать несколько не хуже их. Прежде чем приступить к грумингу, шерсть должна отрасти.

Чтобы шерсть была густой, ее следует держать в чистоте и ежедневно расчесывать. По сравнению с чистыми грязные волосы легче спутываются и сваливаются в колтуны и более ломкие. Так что пудель нуждается в довольно-таки частом и регулярном купании.

Прежде чем купать пуделя, поставьте его на стол для груминга и проверьте, нет ли у него эктопаразитов, в частности блох и клещей. Обнаружив их, выкупайте его с инсектицидным шампунем и тщательно пропылесосьте и обработайте комнаты, где он бывает, включая место для отдыха и подстилку. Обнаружив ссадины, царапины или раны, немедленно обработайте их антисептиком. Не забудьте прочистить параанальные железы, особенно если собака «катается на салазках».

У здоровой собаки кожа стерильная, так как покрыта биологически активной пленкой, обладающей дезинфицирующими и дезодорирующими свойствами, а шерсть смазана кожным салом, придающим волосам блестящий здоровый вид.

Для купания вам потребуются старая одежда (чтобы малыш, решив отряхнуться, не замочил вас с головы до ног), ванна с резиновым ковриком на дне (тогда лапы не будут скользить по дну и разъезжаться в стороны, а пес будет чувствовать себя вполне уверенно) и гибким душем для обмывания, ватные тампоны для ушей (чтобы защитить их от попадания воды), растительное масло для глаз (чтобы защитить от случайного попадания в них шампуня), шампунь-кондиционер для собак и махровое полотенце.

¹ Г р у м и н г — гигиенический уход за животным, включающий подстригание когтей, расчесывание и купание.

Перед купанием собаку следует хорошо выгулять, иначе после него она будет рваться на улицу, чтобы вывалиться в грязи.

Вода для купания должна быть теплой, как для младенца. Заткните уши собаки берушами или ватными шариками, закапайте в каждый глаз по капле растительного масла, соберите волосы на голове в «хвост» и поставьте ее в ванну. Тщательно смочите шерсть водой из-под душа до самой кожи, за исключением головы и морды (в конце купания их следует просто протереть влажной губкой или тряпочкой). Возьмите немного гипоаллергенного шампуня для собак и вотрите в шерсть на спине до самой кожи, затем точно так же смочите им конечности, шею, хвост и живот. Теперь смойте шампунь из душа большим количеством проточной воды. Не спешите. Оставленный на шерсти шампунь сделает ее тусклой и приведет к зуду кожи. Если вы пользуетесь инсектицидным шампунем или средством от клещей, сначала тщательно изучите аннотацию к ним.

При купании собаки перед выставкой воспользуйтесь в качестве ополаскивателя кремом-кондиционером с низким содержанием жира, в противном случае шерсть будет выглядеть слишком жирной. Если вы пользуетесь только жирным кремом, то в этом случае его следует предварительно тщательно развести, а лучше сменить на менее жирный. Как правило, в инструкции по применению кондиционера рекомендуется тщательно ополаскивать собаку после его нанесения. В противном случае волосы либо склеятся между собой, либо будут слишком жирными.

Есть кондиционеры, которые не следует смывать с шерсти. Если вы пользуетесь ими, внимательно прочитайте инструкцию и строго соблюдайте ее.

При обычном купании, когда вы не собираетесь выставлять собаку на ринге, возьмите шампунь с более сильным кондиционером или с легким маслом.

Тщательно смыв шампунь, отожмите воду с шерсти, удалите из ушей тампоны и протрите их салфеткой, смоченной в растительном масле. Теперь вы можете укутать питомца в полотенце, вынуть его из ванны и начать насухо вытирать шерсть, особенно на груди и животе. Про-

сушив шерсть, дайте собаке несколько раз встряхнуться и снова протрите ее, уделив особое внимание волосам на животе и «буфам». Учтите, что вода стекает вниз, так что тщательно проверьте, не остались ли мокрыми живот и конечности. Досушить шерсть можно феном. Помните, что шерсть, высыхая самостоятельно на воздухе, начинает курчавиться, чего не следует допускать. Просушивая шерсть, одновременно расчесывайте и укладывайте ее. Не включайте фен на полную мощность, иначе вам придется сбрызгивать высыхающую шерсть из пульверизатора, чтобы правильно ее расчесать, и накладывать влажные полотенца на те или иные участки, чтобы она не сохла там, где не следует. Расчесывайте волосы в одном направлении (в одной манере), придерживаясь этого правила и перед самым выходом на ринг.

Начинайте расчесывать волосы с середины шеи по направлению вверх и вперед (к позвоночнику). Высушив это место, спускайтесь вниз на бок или продвигайтесь к хвосту. Если волосы у самых корней начинают завиваться или имеют другой по сравнению с концами оттенок, значит, они не высохли, и процедуру следует повторить.

Обнаружив, что шерсть осталась жирной, повторно вымойте собаку.

Шерсть на «буфах», «седле» и «розетках» короче, чем на корпусе, поэтому сохнет быстрее. Проследите, чтобы она не высохла до того, пока не будет тщательно расчесана пуходеркой. Если это все же случилось, пройдите по ней влажной щеткой, а затем вновь пуходеркой. Обратите внимание на волосы передней поверхности грудной клетки. Они чаще всего не желают лежать должным образом, поэтому, просушивая и расчесывая шерсть, приходится часто увлажнять ее.

Не забывайте проверять, полностью ли высушен каждый участок шерсти. Иначе волосы начнут завиваться. Помните, что влажные волосы имеют более темный оттенок по сравнению с сухими. Особенно тщательно высушите волосы под мышками и на внутренней поверхности ушей. Убедившись, что собака высохла, расчешите ее, как перед выставкой.

При использовании улучшающих структуру волоса средств и не позволяющих им виться в течение нескольких часов, наносите их в небольшом количестве во время заключительного расчесывания.

Старайтесь как можно реже прикасаться к шерсти руками, пока не закончите тримминг и демонстрацию собаки на ринге, ведь на ваших руках находится жир, который впитывается шерстью собаки при ее поглаживании, и она становится волнистой или вьющейся. Постарайтесь защитить собаку от непогоды, чтобы шерсть не намокла и не стала виться. Это, кстати, происходит и при высокой влажности воздуха.

Для ухода за волосами вам понадобятся специальные инструменты и знания. У вас должны быть массажная щетка (эластичная и упругая, с металлическими зубьями на резиновой подушечке), пуходерка — для тоев и миниатюрных пуделей поменьше, для стандартных побольше, грейхаундовский скребок (с редкими округлыми зубьями для расчесывания поверхностно спутавшихся волос — расческа-«грабли»), большая расческа с частыми зубьями, фен и пара машинок для стрижки с дополнительными насадками. При выполнении выставочных стрижек пользуются преимущественно насадками под номерами 40, 30, 15 и 10. Чем меньше номер насадки, тем длиннее остается волос после стрижки. Так, например, насадка номер 40 служит для сведения волос на нет, а насадки под номерами 07 и 04 применяются, когда вы хотите лишь слегка подровнять шерсть, то есть почти исключительно для повседневных стрижек. Вам потребуются также приспособление для заточки и чистки лезвий и спрей для охлаждения машинки при ее интенсивном использовании.

Обязательно купите фен, набор вязальных спиц, чтобы разбирать шерсть, пульверизатор, несколько крепких резинок, шампуни, кремы-ополаскиватели и масло для шерсти.

Для ежедневного расчесывания волос вам следует научить питомца спокойно и выдержанно лежать на столе для груминга на боку. Осваивайте навык решительно и

твердо, стараясь при этом не напугать собаку. Стол для груминга — главный предмет обстановки, в которой собака готовится к выставке. На нем ее расчесывают и стригут, а на выставочном столе (кроме стандартных пуделей) — осматривают эксперты.

Начинайте расчесывать шерсть собаки с правой стороны, потому что с левой ее будет осматривать эксперт. Для повседневного расчесывания это не имеет никакого значения, но все же лучше придерживаться раз и навсегда принятого распорядка.

Разумно распределите расчесываемые участки, начиная с шеи. Шаг за шагом расчешите сначала один небольшой участок, затем другой, постепенно продвигаясь к хвосту, а от него — к животу. Расчесывайте волосы вверх, к позвоночнику. Разберите вручную каждый участок. Доберитесь до самой кожи. Затем слегка увлажните участок из пульверизатора водой, разведенной кремом-ополаскивателем или легким масляным спреем, и тщательно расчешите волосы массажной щеткой. После этого расчешите шерсть расческой, прислушиваясь к издаваемым ею звукам (продираясь сквозь спутавшиеся волосы, расческа издает определенный звук, а по расчесанным скользит беззвучно). Своевременно удаляйте набившиеся на расческе волосы. Пройдитесь по шерсти грейхаундовским скребком, чтобы не осталось поверхностно спутавшихся волос. Если же он не справляется и рвет волос, расчешите этот участок массажной щеткой.

При уходе за длинными волосами расчесывайте их массажной щеткой, а за короткими (на животе) и подстриженными участками («седло» и «буфы») — пуходеркой. Шерстный покров окончательно формируется после полового созревания собаки, и к этому же времени у вас появляется опыт по уходу за ним, так что вы сможете без особого труда пользоваться щеткой, прихорашивая длинные волосы. Но на первых порах используйте для этого массажную щетку, она не так рвет волосы. Пользуясь ей, проследите, чтобы она шла без усилий. Расчесывайте волосы от корней, практически от самой кожи, к концам плавными движениями, без напряжения лучезапястного

сустава. На расчесанном участке не должно оставаться спутанных или свалявшихся волос.

Если вы обнаружили колтуны (участки спутанных волос), попробуйте осторожно разобрать волосы пальцами. Чтобы облегчить задачу, можно смочить это место легким маслом. Разобрав волосы, расчешите их массажной щеткой. Как только она начнет легко скользить, пройдите по ней пуходеркой, чтобы вычесать небольшие комочки.

Никогда не расчесывайте сухую шерсть. Предварительно смочите ее каким-нибудь увлажнителем.

У выставочного пуделя волосы на топноте и ушах, как правило, собирают в «хвост» и скрепляют резинкой или накручивают на папильотки (или бигуди). Снимите папильотки или резинки и аккуратно разберите шерсть. Для того чтобы не выдирать волосы и не тянуть за них, шерсть предварительно слегка увлажняется, а уж затем расчесывается. Волосы, закрученные на папильотках, расчесываются в последнюю очередь, после чего вновь заворачиваются, чтобы сохранить их в должном виде и защитить от ломкости и сечения.

Как правило, шерсть у маленьких щенков и взрослых собак спутывается за неделю, поэтому и расчесывать ее следует не чаще этого срока. Правда, во время формирования шерстного покрова, то есть в переходном периоде, волосы на отдельных участках тела могут сваливаться, и их приходится расчесывать ежедневно, а то и дважды в день.

Несколько раз расчесав собаку, вы поймете, в каких местах у нее чаще всего появляются колтуны. Будьте внимательны и отныне ощупывайте эти места руками. Расчесывайте волосы при малейшем намеке на их спутывание. Короче говоря, интервал между расчесыванием должен быть как можно больше, до спутывания и сваливания волос.

Малышам следует регулярно и довольно-таки часто подстригать мордочки, лапы и хвосты. По мере роста волос вам придется слегка укорачивать их по бокам исключительно по гигиеническим соображениям.

Некоторые заводчики начинают подстригать волосы на спине ножницами, когда щенкам исполняется примерно

десять—четырнадцать недель. По их мнению, это стимулирует рост волос и улучшает их структуру.

В течение первых шести месяцев жизни собаки особого ухода за ее шерстью не требуется. Однако именно на этом этапе закладываются основы отношения к грумингу взрослой собаки. Шерсть у щенков короткая и недостаточно густая, поэтому легко расчесывается пуходеркой (буквально за несколько минут). Регулярно расчесывайте ее, приучая щенка спокойно лежать на боку.

Однажды вы обнаружите, что у щенка первых шести месяцев жизни волосы на топноте начинают спадать на глаза. Зачешите их наверх и, собрав в «хвост», стяните резинкой. А когда отрастут волосы на ушах, то используйте этот же прием и на них. Учтите, что резинка не должна располагаться близко к ушной раковине, а тем более сдавливать ее, иначе произойдет нарушение кровообращения и резинка-«удавка» приведет к беде — не просто выпадению волос в этом месте, а и к некрозу мягких тканей.

Отросшую к шестимесячному возрасту шерсть щенка надо чаще расчесывать между купаниями. Можно сменить пуходерку на массажную щетку. Следите за участками, на которых легко образуются колтуны, — ушами, грудью, локтями и холкой. Не забывайте о топноте — волосы на нем, как и на ушах, можно начать закручивать на папильотки.

Щенков заворачивают в полотенце несколько иначе, чем взрослых собак, так как у них более короткая и менее густая шерсть и они не понимают суть укутывания, стараясь избежать его.

С самого раннего детства пуделя следует приучить к подстриганию когтей. В первый раз это делают в шестидневном возрасте, чтобы своими когтями, загнутыми, как рыболовный крючок, щенок не поцарапал грудь матери, что может привести к воспалению сосад и развитию у нее мастита. После этого когти щенка постоянно подстригают когтерезками по мере их отрастания. Новый владелец, купивший щенка, постоянно должен следить за состоянием его когтей и вовремя подстригать их, иначе ма-

лыш, цокающий по полу орлиными когтями, будет иметь распушенную лапу, неправильный постав конечностей и порочные движения. Когда он подрастет, пройдет профилактическую иммунизацию и трехнедельный карантин после нее, вы начнете гулять с ним на улице, где он самостоятельно будет стачивать когти об асфальт. Но и в этом случае нужно следить, чтобы у него не было заусенцев, которые можно убрать при помощи напильника или пилки для ногтей. В противном случае у вашего питомца может развиться паронихия (подкожное воспаление в области когтевого валика), из-за чего он начнет хромать, что также может привести к неправильному поставу конечностей, распушенности лап и нарушению правильных движений.

Чтобы подстричь когти, приподнимите лапу своего питомца чуть вверх и вперед. Лево́й рукой крепко зажмите его пальцы за когтевыми фалангами, вооружившись кусачками или когтерезками — в правой. Если у него светлые когти, вы увидите через просвечивающуюся когтевую пластинку (чехол) нежную, розовую, богатую сосудами и нервными окончаниями мякотную зону роста. Вы должны срезать коготь чуть не доходя до нее. Если же у щенка черные когти, срежьте лишь ту часть когтя, которая загнулась крючком, то есть ближе к началу изгиба (его нетрудно увидеть, смотря на коготь сбоку).

Если вы будете стричь когти правильно, ваш пес ничего не почувствует, кроме легкого сдавливания, которое ощущаем и мы, подстригая свои ногти. Если же вы случайно повредите чувствительную зону, он испытает острую боль, а область среза начнет кровоточить. Не пугайтесь, это кровотечение легко остановить с помощью любого кровоостанавливающего средства для людей, кусочка мыла или муки, в которые следует погрузить коготь на 1—2 минуты.

Кроме когтей и шерсти, вам следует ежедневно осматривать глаза, уши и полость рта у своего питомца. В первую очередь вам следует почистить питомцу уши, взяв для этого марлевую салфетку и удалив скопившуюся в ушном проходе серу и грязь. Если у него сухая мочка носа, смажьте ее тонким слоем вазелинового масла. Протрите глаза, даже если во внутренних углах глаз скопились скудные

выделения. Зубы и десны следует осматривать для того, чтобы вовремя обнаружить воспаление, кариес, проследить, насколько правильно проходит смена зубов и не произошло ли так, что молочный зуб не выпал, а коренной уже вырос за ним или в стороне от него, а также для своевременного обнаружения мягкого зубного налета или камня. Вам следует приучить малыша к этому, а также к ежедневному уходу за зубами с помощью зубной пасты и щетки для собак. Приучение щенка к ежедневному осмотру пасти может спасти его в будущем, особенно если вам потребуется дать ему лекарство или срочно вынуть у него изо рта несъедобный или ядовитый продукт. Для этого крепко зафиксируйте его голову, после чего спокойно и нежно приподнимите верхнюю губу. Мягкая зубная щетка для собак или махровая салфетка, смоченные в трехпроцентном растворе пищевой соды, а также корка лимона или апельсина прекрасно снимут мягкий зубной налет. Если же на эмали зубов имеются цветные пятна или винный камень, покажите питомца ветеринару. Жесткие бисквиты для собак, сухой гранулированный корм, мозговая кость, цельная морковь, кочерыжка и нейлоновые игрушки помогут сохранить вам зубы у своего питомца белыми.

КОРМЛЕНИЕ

Высококачественный, сбалансированный рацион предотвращает развитие заболеваний, связанных с недостатком питательных веществ в организме животного. Кроме того, он позволяет избежать у собаки развития инфекций и заболеваний внутренних органов.

Лучше всего кормить пуделя промышленными кормами. Их дают строго по аннотации, написанной на упаковке. Я уже говорил, что, купив щенка и принеся его домой, первые 10 дней ему дают тот же корм, которым кормил его заводчик. Вводить новый рацион следует постепенно, в течение пяти дней, ежедневно добавляя пятую часть нормы нового корма, на столько же сокращая суточную дозу старого. Если ваш малыш получает сухой корм, да-

вайте его три раза в день, пока он не наберет половину веса взрослой собаки, когда суточную дозу можно будет разбить на два кормления. У пуделя хороший аппетит, и он редко оставляет в миске недоеденный корм. Во избежание ожирения, к которому склонна порода, не перекармливайте своего питомца — это пагубно сказывается на здоровье. Поэтому миску с кормом ставят собаке на время до 15 минут, вне зависимости от того, успела она поесть или нет. Она должна понять, что именно вы кормите ее, причем не тогда, когда ей этого хочется, а тогда, когда вы считаете это нужным. Если вы не хотите, чтобы она была привередливой, у нее не должно быть выбора в еде. С годовалого возраста собаку можно перевести на разовое кормление кормами для взрослых собак.

Я уже подчеркивал, что кормить собаку следует в одни и те же часы и в специально выделенном для этого месте, после чего ее сразу же следует выгулять. Привычный режим благоприятно сказывается на пищеварении и нормальном опорожнении кишечника.

Давая промышленный корм, помните, что свежую питьевую воду, во избежание перекрута желудка и инвазии кишечника, стоит убрать на время кормления, поставив миску с водой не ранее чем через полчаса после того, как собака поест.

Поев, собака должна немного отдохнуть. Не играйте с ней в активные игры и не давайте физических нагрузок — это делается на голодный желудок. Лучше всего кормить щенка в восемь часов утра, в полдень и в восемь часов вечера. В жаркую погоду собаку лучше кормить по холодку — рано утром или поздно вечером. Не кормите питомца перед физическими занятиями и поездками во избежание рвоты.

Если вы кормите малыша сухим кормом, не давайте ему никакой другой еды и витаминно-минеральных подкормок (супплементов), иначе у него произойдет дисбаланс по белкам, жирам, углеводам и витаминам, что может привести к развитию аутоиммунных процессов, нарушению метаболизма и ряду заболеваний, плохо поддающихся лечению.

А вот если рацион вашего питомца состоит из домашней пищи, без супплементов вам не обойтись. Правда, потребность интенсивно растущего щенка в микро-, макро-элементах и витаминах ежедневно меняется, и рассчитать ее на единицу его веса не так-то и просто.

Как решить, что выбранный вами корм подходит вашему питомцу? Очень просто. Он должен с удовольствием есть его и выглядеть плотно сбитым и мускулистым, а не лещеватым или ожирелым. У него должны быть правильная структура шерсти, ясные, чистые, искрящиеся лукавством глаза, хороший аппетит и оформленный стул. Кроме того, вам нужно регулярно взвешивать своего малыша. Для этого можно воспользоваться напольными весами — взвеситься самому, потом с пуделем и из большего веса вычесть меньший.

Если корм идеально подходит вашему щенку, не меняйте его до годовалого возраста, ведь, в отличие от нас, он не нуждается в разнообразной пище.

В период интенсивного развития и роста щенка его рацион должен быть обогащен минерально-витаминной добавкой, причем некоторые владельцы добавляют ее в пищу на протяжении всей жизни своих питомцев.

В период полового созревания (в возрасте 5—11 месяцев или чуть старше) щенок выглядит угловатым (растянутым и высоконогим) и лещеватым (с узковатой грудной клеткой, со слабо развитым фронтом, плосковатыми боками и слишком подобранными пахом и животом), напоминающая гадкого утенка. Но если энергия у него бьет ключом, то, скорее всего, ваш рацион полностью покрывает его потребности в питательных веществах. Запомните, плохой рацион тут же сказывается на качестве шерсти и кожи — волосы теряют свой блеск, становясь тусклыми, секутся, ломаются и выпадают, а кожа покрывается перхотью.

Во время смены зубов аппетит вашего малыша может на время исчезнуть из-за лихорадки. Это не страшно. Он сразу же восстановится, как только прорежется зуб.

Если у вашего питомца, несмотря на волчий аппетит (булимию), шерсть становится блеклой, волосы — ломкими, глаза — с поволокой, взгляд — грустным или отсутствующим,

ющим, а вес постоянно снижается, возможно, у него глистная инвазия или заболевание внутренних органов. Срочно покажите его ветеринару, чтобы он поставил диагноз и назначил лечение.

Говоря о полусухих (полувлажных) кормах, хочу отметить, что они гораздо удобнее и дешевле самых лучших консервов (влажных кормов), но в них содержится больше соли, сахара и консервантов, так что они не годятся для ежедневного использования. Влажные же корма дают только вместе с кашами или пополам с сухими кормами.

Никогда не давайте своему пуделю шоколад, острую, жирную, пряную, копченую и соленую, а также слишком горячую и холодную пищу, это крайне вредно для его организма. Для некоторых собак шоколад смертельно опасен, а острые приправы и соленая пища приводят к расстройству желудка и снижению порога обоняния. Не пытайтесь разнообразить меню своего питомца. Собака здорова, если питается изо дня в день и в строго определенных часы одной и той же пищей или промышленным кормом. Если ветеринар назначил вашему питомцу суп-плементы, добавляйте их в сухой корм во время обеденного кормления.

Никогда не кормите щенка остатками со своего стола, иначе он станет попрошайкой, воришкой или привередой.

Давая пуделю кости, учтите, что они должны быть сахарными. Давать малышу трубчатые кости птицы, как и вываренные кости, категорически запрещено. Он может расколоть их, поперхнуться ими, а также получить прободение желудка или кишечника. Кроме того, вареные кости не только не перевариваются, но и замедляют пищеварение и прохождение химуса по желудочно-кишечному тракту, что приводит к запорам и травмированию прямой кишки при дефекации.

Взрослая собака также не нуждается в разносолах. Ей вполне достаточно правильно подобранного, качественного, высокосбалансированного сухого гранулированного корма для энергичных собак. А для того, чтобы она имела постоянный вес и крепкое здоровье, ей следует давать корм

два раза в день, так как при одноразовом питании из-за большой суточной порции у собаки нередко отмечается расстройство кишечника. Кроме того, это позволяет сократить потребность натурализованной суки в воде, а старой собаке — быстрее и легче усвоить питательные вещества корма. Если и те и другие постоянно испытывают чувство голода, в их рацион следует добавить вареные овощи, особенно морковь, сельдерей и репу, богатые клетчаткой, вызывающей чувство насыщения.

Отказ взрослой собаки от еды может быть связан с жарой, заболеванием зубов, гингивитом и возрастным снижением остроты обоняния.

Щенных сук со второй половины беременности и вскармливающих своим молоком щенков следует кормить кормами для лактирующих сук, разбив суточный рацион на 5—6 кормлений.

Старая собака нуждается в специальных кормах для стареющих собак и собак преклонного возраста.

Пудель, постоянно экспонирующийся на выставках, испытывает стресс и нуждается в дополнительном количестве питательных веществ. К его обычному рациону можно добавить творог, сваренные вкрутую яйца (но не сырые, так как натуральный белок яйца, в отличие от денатурированного, содержит токсичный для организма собаки белок — овидин, связывающий биотин, витамины группы В и ряд ферментов), сырое мясо, сердце, язык или приготовленную печень (субпродукты в сыром виде собакам не дают во избежание рвоты и диареи), небольшое количество жира и витаминно-минеральную подкормку для собак.

В зимнее время в домах с центральным отоплением из-за пониженной влажности воздуха у некоторых пуделей отмечается сухость кожи и шерсти. В этом случае им стоит добавить в вечерний рацион столовую ложку растительного масла.

Флатуленция (обильное отхождение газов, скопившихся в кишечнике), наблюдающаяся у некоторых пуделей, крайне огорчает их владельцев. Чтобы избавиться от нее, добавьте в вечерний рацион порошок древесного угля.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Для пуделя характерна игривость, понятливость и послушание, которое он может проявить лишь при условии своевременного прохождения социализации. Социализация — сложный процесс, начинающийся с трехнедельного возраста, когда щенки начинают изучать окружающий их мир. С этого времени мать обучает их хорошим манерам поведения, чистоплотности, первым навыкам нападения и самозащиты, призывает их к игре и вовремя останавливает грозным рыком разыгравшегося, разошедшегося или пытающегося уйти подальше от гнезда малыша. Играя между собой и вступая в потасовки, щенки учатся, как вести себя друг с другом. Заводчик же, постоянно общающийся с пометом в целом и с каждым щенком в отдельности, приучает их к посторонним шумам и звукам, к другим своим домашним животным и домочадцам, пресекая любую агрессию с их стороны и поощряя миролюбивое поведение. Как только щенки попадают в новые руки, их владельцы с первых же дней продолжают знакомить своих малышей с окружающим миром, со всеми домочадцами, а выводя на улицу — с посторонними людьми и животными, к которым их питомцы должны быть лояльными или безразличными. Социализированный щенок никогда не будет представлять угрозы обществу, наоборот, из него вырастет жизнерадостный пудель и преданный друг.

В противном случае вы получите робкого, пугливого пуделя, пускающегося наутек в любой конфликтной ситуации, забивающегося в угол и не желающего выходить из него, так как он нигде не чувствует себя в безопасности, кроме своей клетки и квартиры хозяина, или агрессивно-оборонительную реакцию, от страха атакующего любого, кто попытается подойти к нему, даже дружелюбно настроенного ребенка. Кроме того, такой пудель не склонен к обучению, и его тяжело научить какому-нибудь навыку.

К счастью, такое случается редко, так как заводчики прекрасно понимают роль ранней социализации в жизни щенка.

Критический период социального развития щенков длится с момента их рождения до четырехмесячного возраста. До двухмесячного возраста, то есть до окончательного формирования характера, когда каждый щенок становится личностью¹, щенки учатся у своей матери и друг у друга. Она учит их уважать ее и других домашних животных владельца, включая собак, если таковые есть, благодаря чему им легче будет усваивать новые навыки, когда они подрастут. Огромную роль в социализации щенка играют игры с однопометниками и с матерью. Благодаря им малыш обучается поведению и общению с собратьями, умению контролировать себя и сдерживать агрессивное поведение. Бурные потасовки, устраиваемые щенками, снижают у них порог болевой чувствительности и делают их менее чувствительными к резким звукам. Благодаря чему, став взрослыми, они легче переносят шумную компанию детей и лающих соплеменников.

Критический период определяется как стадия развития, когда воздействие слабого стимула вызывает явные изменения поведения в дальнейшем. Он включает следующие периоды и этапы:

- 1) новорожденный щенок — 1—2 недели;
- 2) промежуточный период — 2—3 недели;
- 3) социализация — 3—9 недель;
- 4) оптимальная социализация — 3—5 недель;
- 5) начало игр в драку — 3—5 недель;
- 6) начало виляния культей хвоста — 4 недели;
- 7) начало реакции страха — 5 недель.

Во время первого периода новорожденный щенок энергично растет, оставаясь пассивным (он практически не реагирует на внешние раздражители). В промежуточ-

¹ Л и ч н о с т ь — психологический облик животного, имеющего только ему присущие особенности, сложившиеся за счет влияния окружающей среды, научения, прошлого опыта и особенностей темперамента. Вместо понятия личность, мы чаще говорим о стиле животного, или о совокупности его индивидуальных черт — экстерьера, темперамента, манеры поведения и породного типа, обуславливающих единую и неповторимую композицию, его эго.

ном периоде у него происходят явные перемены: на 11—19-й день он прозревает, а на 13-й день — начинает слышать. То есть он начинает реагировать на увиденное и услышанное и приступает к изучению окружающего его мира. Если вы протянете к щенку руку, он начнет пятиться. А вот на резкие шумы и звуки он не реагирует до трехнедельного возраста. В редких случаях щенки рождаются зрячими или открывают глаза сразу же после рождения, но такие малыши редко живут дольше двухнедельного возраста.

С 18-го дня щенок начинает учиться ходить, еще неуверенно держась на конечностях. Переход от ползания (нередко плавания) к раскачивающемуся движению происходит резко. С этого времени он начинает активно играть с однопометниками.

С трехнедельного возраста у щенка появляется осязание, обоняние, вкус, ориентировочная реакция на шумы и звуки, самостоятельное мочеиспускание и дефекация (правда, он еще не умеет их контролировать). С этого времени он меньше тратит времени на сон, а проснувшись, начинает исследовать окружающую обстановку, бродить по гнезду, пытаться выбраться из него и играет с матерью и однопометниками. Его память еще слишком короткая, поэтому он помнит о каком-либо раздражителе всего несколько секунд.

В первые три недели жизни щенок полностью зависит от матери. Он нуждается в ее молоке, уходе, массаже и тепле ее тела, впрочем, как и окружающих его однопометников. Мать необходима ему до семинедельного возраста (правда, в последние две недели гораздо меньше), особенно на четвертой неделе жизни, когда он развивается наиболее интенсивно. Отнятие его от матери в это время крайне нежелательно, ведь на этом этапе она приступает к его обучению. К пятинедельному возрасту малыш уже адаптирован к окружающей среде, но это возраст активных игр и драк с однопометниками, во время которых он многому учится, а мать приучает его к дисциплине.

К семинедельному возрасту мозговая деятельность у щенка становится такой же, как и у взрослой собаки. По-

этому это самое подходящее время для его отъема от матери и передачи новому владельцу. С этого момента и до четырехмесячного возраста характер щенка будет формироваться под влиянием воспитания и обучения.

Периоды обучения и социализация длятся всего несколько недель. Если щенок на этом этапе лишен общения с другими собаками и людьми, то будет неадекватно относиться к ним при встрече, когда вырастет. Кроме того, существует оптимальный промежуток социализации. Щенок, впервые увидевший человека в возрасте 5—7 недель, социализируется быстрее, чем если бы это произошло до или после этого периода. Социализация наступает за крайне короткий промежуток времени, о чем не следует забывать.

Учтите, что характер и привычки щенка складываются за очень короткий период, так что к девятинедельному возрасту он уже становится бесстрашным или трусливым, сдержанным или робким, легко или трудно обучаемым. То есть природа дала ему крайне ограниченный срок, чтобы стать личностью. Вы должны помочь ему в этом начиная с трехнедельного возраста, иначе он сам познает новый мир запахов и красок и адаптируется к окружающей среде, самостоятельно поймет, что представляет для него опасность, а что — нет. В этом случае привычки и навыки, приобретенные им без вашей помощи, могут крайне не понравиться вам и всем окружающим, но исправлять их будет уже поздно. Вы обязаны доказать ему, что он находится в дружески настроенном к нему мире, лишь тогда ваш малыш вырастет в смышленного, легко обучаемого, послушного, хотя временами и упрямого, без памяти влюбленного в вас, готового на все ради вас, самоуверенного и сдержанного пуделя, миролюбиво настроенного к людям, соплеменникам и другим животным, не пугающегося и не возбуждающегося от неизвестно откуда появившихся внешних раздражителей.

Знакомя щенка с миром, никогда не беседуйте с ним и не поощряйте, если он чего-то испугался, а, наоборот, покажите, что ситуация, внушившая ему страх, не представляет для него никакой угрозы. И наоборот, если он

проявляет ко всему интерес, ничего не боится и не проявляет агрессивного поведения в конфликтной ситуации, щедро похвалите его за проявленную отвагу.

Не следует забывать, что исследовательский инстинкт и страсть преследования движущихся объектов наиболее выражены у щенка в 7—8-недельном возрасте, так что выгуливайте его и гуляйте с ним в это время только на поводке.

И, самое главное, обучение щенка должно начинаться с четырехнедельного возраста и продолжаться всю оставшуюся жизнь.

ТРЕНИНГ¹

Крепкое здоровье, уравновешенная нервная система, рациональное кормление, дисциплина и тренинг продлят долголетие вашего питомца. А если речь идет о суке, то хорошо развитые мышцы живота и тазового дна значительно облегчат ей щенение.

Ничто так не укрепляет здоровье и нервную систему владельца и его питомца, как прогулки быстрым шагом на большие расстояния. Если у вас нет на это времени, поиграйте с питомцем в футбол, покидайте ему палку или тарелку для игры во фрисби, погоняйте в гору или заставьте приносить палку с воды. Занятия лучше всего проводить на специально оборудованной или на дрессировочной площадке, где уже есть или можно разместить переносные и стационарные тренажеры. Для тренинга и игр пуделю понадобится также пара его любимых игрушек — он знает, что с ними делать, и прекрасно проведет время без вас.

Главное, чему вы должны обучить своего щенка до четырехмесячного возраста, — элементарным навыкам поведения в обществе и почти автоматическому выполнению ваших команд, особенно «Место!», «Ко мне!» и «Нельзя».

¹ Т р е н и н г, или тренировка, — регулярные упражнения с собакой по развитию, совершенствованию и закреплению навыков.

Команда «Фу!» подается лишь в экстремальных ситуациях, когда следует немедленно прекратить нежелательные действия со стороны собаки.

ОБУЧЕНИЕ ЩЕНКА ОСНОВНЫМ НАВЫКАМ

Будет лучше, если вы запишете своего питомца на курсы по послушанию, на которых он сможет получить основные навыки и общение с соплеменниками, а вы узнаете, как правильно тренировать его дома, чтобы закрепить их. На занятиях в группе он познакомится с дрессировочными предметами, различными бытовыми и непредвиденными ситуациями, а также поймет, как приятно радовать вас чисто выполненными командами по послушанию: усадки, укладки, выставочной стойки для осмотра, хождения рядом на поводке, включая запрещающие — «Нельзя!» и «Фу!». Кроме того, занятия еще больше сплотят и сдружат вас, сделав единой командой. Вы оба поймете, как интересно общение с другими владельцами пуделей, лучше узнаете выбранную вами породу и вовремя сможете пресечь первые признаки агрессии у своего щенка к другим собакам.

Если ваш малыш боится громких звуков, вспомните, какой шум может вызвать у него приятные эмоции. Например, вместо того чтобы окликать его, приглашая поесть, постучите по пустой миске ложкой, а как только он прибежит на звук, бросьте ее (в стороне от него) на пол и сразу же наполните едой. Можно поступить иначе. Когда он начнет есть, включите радио на полную громкость, захлопайте за спиной малыша в ладоши или бросьте на пол связку ключей. Ваш пудель должен научиться адекватно реагировать на резкие звуки и шумы, главное, чтобы они ассоциировались у него с положительными эмоциями или приятными ощущениями.

Учтите, что в возрасте 2—2,5 месяцев ваш жизнерадостный и самоуверенный щенок может вдруг стать робким, боязливым и недоверчивым к посторонним. Не поощряй-

те этого, не приободряйте его словами и не ласкайте. Он должен понять, что вы гордитесь им только тогда, когда он смел и дружелюбен, а не труслив или агрессивен.

Если ваш малыш трясется от страха, завидя никогда не виданный доселе предмет, спокойно подойдите к нему на его глазах, присядьте на корточки, потрогайте, потрепите напугавшую щенка вещь и радостно-воодушевленным тоном подзовите его к себе, чтобы он смог тщательно приглядеться и привыкнуть к ней. Щенок любознателен, так что исследовательский инстинкт должен взять верх над страхом, пусть даже он поползет к устрашающему его предмету на животе. Похвалите его за смелость. Если предмет небольшой, возьмите его в руки и откатите от питомца, но не в его сторону, чтобы спровоцировать у него инстинкт преследования. Вы даже не заметите, как ваш малыш начнет с ним играть, с удовольствием катая и гоняясь за предметом, еще не так давно испугавшим его.

ОБУЧЕНИЕ ХОРОШИМ МАНЕРАМ

Приступая к обучению щенка, вы в первую очередь должны приучить его отзываться на собственную кличку, к месту и к командам «Фу!» и «Нельзя!». Команда «Фу!» должна подаваться строго-угрожающим голосом и лишь в экстремальных случаях, когда действия собаки должны быть немедленно прекращены, чтобы не перерасти в дурную привычку или не подвергать опасности свою или чужую жизнь. Пользуйтесь ею только тогда, когда поведение вашего питомца действительно плохое. При этом резкий тон вашего голоса с угрожающей интонацией мгновенно подействует на собаку. Если этого не произошло, подойдите к малышу и еще раз, но более громкоподобно и отрывисто скомандуйте «Фу!», одновременно встряхнув его за загривок, как это делает мать, когда хочет поставить разошедшегося или провинившегося щенка на место. Это не больно, но очень неприятно, так как лишает питомца опоры, а значит, и уверенности в себе. После такой встряски малыш, выведший вас из равновесия, непременно поймет, что вы от него хотите.

Во всех остальных случаях подается запрещающая команда «Нельзя!», отдающаяся громким, настойчивым и угрожающим, но не раздражительным голосом. Она означает, что малыш должен немедленно прекратить какие-то действия, которые вполне приемлемы в другое время, но не в данную минуту, например, когда малыш разыгрался, войдя во вкус, а вам нужно заняться своими делами, чего он явно не хочет понимать.

Кроме этого, появившегося в вашем доме щенка пуделя следует сразу же начать приучать к чистоплотности. Это не так-то и сложно, ведь пудели чистоплотны по своей природе, поэтому никогда не облегчаются там, где живут, едят и спят. Для обучения малыша хорошим манерам и чистоплотности вам потребуется клетка. В противном случае, оставшись без присмотра, он нагадит там, где ему прищичит, ведь до четырехмесячного возраста он еще не умеет терпеть достаточно долго и контролировать свои естественные надобности. Кроме того, клетка приучит малыша к месту. Ведь именно в ней он чувствует себя в полной безопасности, как и его дикие предки и сородичи в логове. Так что, уходя из дому, поместите малыша в клетку и поставьте ее около двери. Вернувшись, сразу же выгуляйте малыша и похвалите за то, что он так долго терпел. Если же он все-таки помочился в клетке, не ругайте его, ведь память малыша на незначительные в его жизни события, а уж тем более на естественные надобности, кратковременная. Сделав дело, он уже через секунду забывает об этом, увлекшись чем-то другим. Поэтому, если вы, придя домой и обнаружив кучу или лужицу на полу, начнете ругать его, он не сможет понять, что же вас так возмутило, ведь он так долго ждал вас и с такой радостью бросился к вам навстречу. Необоснованное наказание, с его точки зрения, приведет к тому, что в следующий раз малыш справит нужду в более укромном месте, не сразу бросающемся в глаза, и откажется встречать вас, если вообще не забудется от страха в угол. Таким образом, вы потеряете его любовь и доверие к вам. Столкнувшись с такой ситуацией, лучше сразу приберите в клетке, вымойте ее и замените сырую подстилку сухой или уберите кучу, вытрите лужицу на полу и за-

мойте это место раствором столового уксуса. Если вы не углядели и малыш нагадил на ковре, также не ругайте его и не тычьте носом в кучу — вы не должны были оставлять его без присмотра в комнате. Если вам хочется, чтобы малыш был чистоплотным, нужно было следить за ним и застать момент, когда он только начинал принюхиваться к ковру и кружить на месте, чтобы пристроиться и справить нужду. А заметив это, нужно было сразу же подхватить его и вынести на улицу. Так что вы упустили свой шанс, и вам ничего не остается, как молча убрать кучу и замыть ковер, напоминая щенку траву на лужайке, с пищевым уксусом, чтобы на нем не осталось запаха фекалий или мочи, иначе он постоянно начнет отмечаться на этом месте. Убирать испражнения и замывать лужицы на глазах у щенка следует не только из гигиенических соображений, но и для того, чтобы он знал, что поступил неправильно.

Во время приучения малыша к чистоплотности огромную роль играет дисциплина и четкий распорядок дня, в частности кормление и выгул в одни и те же часы. Дело в том, что щенок оправляется после сна, отдыха, активных игр и каждого кормления. Поэтому утром, как только малыш проснется, сразу же вынесите его на улицу и похвалите, как только он сделает свои дела. Вернувшись домой, накормите и напоите его, после чего еще раз хорошенько выгуляйте. Если вам нужно уйти из дому или заняться своими делами, посадите щенка в клетку или закройте в небольшой, легко моющейся и убирающейся комнате.

Выгуляйте малыша перед обедом и сразу же после него, затем вечером — до ужина, который должен быть не позднее 6—7 часов вечера.

Не забывайте, что выгул и прогулки — не одно и то же. Во время первого малыш справляет свои естественные потребности, а во время вторых — познает мир, проходит социализацию, играет в активные игры и занимается тренингом.

Перед сном, прежде чем поместить малыша на место в клетку, в последний раз выгуляйте его, ведь ему предстоит терпеть до утреннего пробуждения.

Заметив, что играющий щенок вдруг начал кружить на месте и обнюхивать пол, пыhtеть и кряхтеть, садиться на корточки или пулей вылетел из комнаты без видимой на то причины, немедленно выгуляйте его. И помните, что после длительных физических нагрузок большинство щенков испытывает желание облегчиться. Поэтому после каждой сверхактивной игры сразу же выводите своего питомца на улицу.

Если вы застанете малыша, когда он уже присел на корточки, чтобы справить свои надобности, не злитесь, а резко топните ногой или хлопните в ладоши. Испугавшись, он прекратит свои действия. Вы же должны мгновенно подхватить его и вынести на улицу, где радостным тоном вдохновенно похвалить малыша, как только он оправится. Вопреки распространенному убеждению не следует бить малыша свернутой в трубку газетой, иначе он начнет гадить в более укромном месте, в котором вы не сможете, как ему кажется, поймать его на месте преступления. Запомните, ни выговор, ни шлепок газетой, ни тыканье мордой в кучу или лужицу никогда не заменят выгула с щедрой похвалой за то, что малыш сделал свои дела в положенном, с вашей точки зрения, месте.

Таким образом, рациональное кормление, строгий режим и распорядок дня и выгул по часам приведут к тому, что малыш поймет, что от него требуется. Чтобы порадовать вас, он научится терпеть и соблюдать чистоту в доме, а вы получите преданного и надежного друга.

Подзыв

Подзыв, или команда голосом «Ко мне!» — самая главная, которой следует обучить любую собаку. При этом она должна откликаться на собственную кличку и беспрекословно подходить к вам. Учтите, что этот навык никогда не должен ассоциироваться у собаки с наказанием, иначе она не будет выполнять его.

При подзыве голос должен быть ровным, а тон — приказным. Команда должна подаваться как можно чаще, быть

четкой, короткой и всегда одной и той же, например «Ко мне!» или «Подойди!». Каждый раз меняя ее, вы лишь запутаете собаку, которая не будет знать, что вы от нее хотите.

При отработке навыка вам следует сначала объяснить собаке смысл команды и слова «ко мне», а перейдя к занятиям — сразу же поощрять ее, как только она ее выполнит, или поправлять, если допустила ошибку или отказалась подходить к вам. Приступайте к занятиям в часы кормления, перед выгулом и прогулками, чтобы навык ассоциировался у собаки с приятным моментом принятия пищи, справлением естественных надобностей и играми на свежем воздухе. На первых порах отдавайте команду ласковым голосом. Чтобы щенок последовал к вам, используйте рефлекс преследования — отбегите от него и присядьте на корточки, глядя ему в глаза. Как только он подбежит к вам, сразу же похвалите его и предложите лакомство, например еду, если вы звали его поесть. Постоянно повторяйте навык, чтобы закрепить его, приглашая малыша поесть, погулять, поиграть и так далее.

Пока щенок мал, подзывайте его лишь тогда, когда четко уверены, что он придет на ваш зов, а не тогда, когда он чем-то увлеченно занят, например ест, грызет сахарную косточку, играет с излюбленной игрушкой, со сверстниками или оправляется. Не забывайте, что щенок быстро устает, поэтому, чтобы занятия не наскучили ему, почаще перемежайте их с играми, а если он устал, дайте ему передохнуть. Монотонность занятий, как и у детей, вызывает утомление, из-за которого щенок теряет к ним интерес и отказывается учиться. Так что постепенно увеличивайте время занятий, которые должны быть интересными для вас обоих.

В играх, обучающих подзыву, может принимать участие вся ваша семья. Щенку нравится играть в прятки, разыскивать спрятавшихся за шторой или в другой комнате детей, так используйте это для его обучения подзыву. Только учтите, что поданная вами команда должна быть во что бы то ни стало выполнена. Раз разрешив малышу вольность, не ругайте его за то, что в следующий раз он проиг-

норирует вашу команду. В этом виноваты только вы, а не он. Так что научитесь сначала спрашивать с себя, прежде чем что-то требовать от своего питомца, пусть даже немного упрямого от природы. Не забывайте всячески поощрять щенка за каждый правильно выполненный навык и не бойтесь поправлять его, если он допустил при этом ошибку.

Освоив игру в прятки в доме, перенесите ее на безопасную безлюдную уличную площадку, где нет машин, детей и других собак. Когда щенок освоится, незаметно для него спрячьтесь поблизости и подзовите к себе. Как только ваш маленький сыщик разыщет вас, щедро похвалите его и предложите лакомство. После этого поиграйте с ним в салки, подавая команду «Ко мне!» при каждом резком изменении направления своего движения. Чем медленнее малыш реагирует на подзыв, тем быстрее вы должны от него убегать. Когда он подбежит к вам, похвалите его, но не останавливайтесь, а вновь позовите к себе.

При подзыве щенок должен стремглав бежать к вам, а не ползти на животе или нехотя плестись, едва представляя конечности. В этом случае вам нужно заинтересовать его, например все так же отбежать, неся за спиной лакомство.

Обучив щенка живо реагировать на подзыв, не успокаивайтесь на достигнутом. Любой навык требует закрепления путем регулярного повторения.

Хожжение рядом

Для отработки этого навыка вам следует сначала приучить своего малыша к ошейнику и поводку. При этом ошейник не должен сдавливать его шею, как и свободно болтаться на ней. Если вашему питомцу исполнилось пять месяцев, можно воспользоваться самозатягивающимся дрессировочным металлическим ошейником-удавкой. При этом цепочка должна быть составлена из мелких звеньев, легко скользящих через «живое» кольцо, которое при затягивании не должно доходить до «мертвого», к которому крепится поводок, на 4—5 см. Удавка должна без труда надеваться на

шею собаки, а ее «мертвое» кольцо находится на ее загривке с правой стороны, чтобы поводок свободно свисал у вашей левой ноги.

Первое время, приучая щенка к ошейнику, его можно надеть на него на время кормления или активных игр, чтобы он не обращал на него внимания и не пытался снять.

Как только он перестанет реагировать на него, к ошейнику можно будет пристегнуть поводок, который может свободно волочиться за ним. Чтобы малыш случайно не запутался в нем и не зацепился за что-нибудь, ни на минуту не выпускайте его из поля зрения. Когда щенок привыкнет к нему и перестанет обращать на него внимание, выведите его на улицу. На первых порах пусть он идет, куда ему хочется, просто следуйте за ним, держа поводок в руке.

Хорошенько прогулявшись, привяжите ошейник к прочному столбу и спрячьтесь на пять минут. Бесспорно, он бросится вас искать, резко натягивая поводок, жалобно и призывно скуля и взлаивая. Если вы выдержите и останетесь в засаде, он вскоре поймет, что туго натянутый поводок не доставляет ему никакого удовольствия. Выдержав положенное время, выйдите из укрытия, воодушевите малыша ласковым голосом, потрепите его по загривку и поиграйте с ним. На следующий день вы можете повторить урок.

Гуляя с малышом вокруг хорошо знакомой ему игровой площадки или места для выгула, предоставьте ему на время свободу действий. Следуйте какое-то время за ним, после чего незаметно начинайте натягивать поводок и постепенно направлять его за собой. На первых порах гораздо важнее, чтобы он понял, что должен идти слева от вас и в заданном вами направлении, а не чистота выполнения навыка, который вы всегда успеете отточить. Поэтому вас не должно беспокоить, что он несколько отстает, спешит или чуть тянет вбок.

Когда пес признает в вас лидера, станет полностью полагаться на вас и уверенно чувствовать себя на улице, вы сможете максимально уменьшить длину поводка, чтобы перейти к его обучению движению рядом. На этом этапе не стоит бояться, что щенок часто отвлекается, реагируя на каждый внешний раздражитель.

Как только он попытается обогнать вас, пойти в другую сторону или отстать, тут же рывком натяните поводок, поставив его на место. Он должен понять, что почувствует свободу только тогда, когда свободно будет идти у вашей левой ноги. Как только он усвоит это, наклонитесь, похвалите и приласкайте его или даже поиграйте с ним. Если он все-таки будет продолжать натягивать поводок, то, как только его корпус окажется впереди вашей левой ноги, резко поверните направо под углом в 45° и как ни в чем не бывало продолжайте молча идти в том же темпе. Как только питомец поравняется с вами, похвалите его. Он должен понять, что, идя рядом, доставляет вам радость.

Если щенок отстает, повернитесь к нему лицом и тут же начинайте убегать от него спиной вперед, подбадривая ласковыми словами. Как только он вас догонит, похвалите его и поиграйте с ним.

Ежедневно занимайтесь отработкой навыка по 5—10 минут за одно занятие и не забывайте, что имеете дело с легко возбудимой, игривой, азартной, непоседливой и чрезвычайно любознательной собакой. Это хорошо для защитно-сторожевых качеств, но не для прогулок на поводке. Если вы вовремя не обучите своего питомца хождению рядом и беспрекословному послушанию, то именно он будет прогуливать вас, таща за собой на поводке. Поверьте, удержать на поводке сильного, но неуправляемого пуделя крайне сложно, если вообще возможно. Так что, как только ваш малыш начнет натягивать поводок, сразу же развернитесь и следуйте в противоположную от него сторону, чтобы он вынужден был пойти за вами и понять, что лучше быть рядом, чем злить вас.

Обучив пса хождению на натянутом поводке рядом, можно перейти к отработке навыка на свободном поводке. Как только он отвлечется, тут же рывком натяните поводок, расслабив его, когда малыш вновь пойдет рядом с вами, но не хвалите его, ведь он должен сделать это из уважения к вам, видя в вас лидера.

И еще, не приучайте щенка играть с поводком и грызть его. Как только он попытается сделать это, угрожающим, настойчивым тоном скомандуйте: «Фу!»

Ежедневные тренировки проводите по 10 минут в течение недели, а с полугодовалого возраста — по 30 минут в течение двух дней, после чего можно заняться борьбой с рассеянностью и отвлекающими раздражителями. Для этого вам нужно научить щенка не реагировать на брошенную на землю еду, соплеменников, других животных и детей. Так что вам потребуются помощники. Занятия проводятся в неизвестном питомцу месте, чтобы он понял, что не может одновременно следить за происходящим вокруг и за вами. Это вынудит его постоянно держать вас в поле зрения.

Дайте малышу отойти от вас, натянув поводок, после чего сразу же начинайте убегать от него. Как только натяжение поводка ослабнет, немедленно остановитесь, замерев на месте. Если щенок неусыпно следил за вами и вдруг рванул в сторону, увлекшись кем-то или чем-то, резко измените направление и темп движения, перейдя, например, с шага на легкий бег. Как только натяжение поводка ослабнет, замедлите темп движения. На бегу рывок поводка оказывается сильнее, чем при ходьбе, и эффективнее действует на щенка. Главное в обучении — чтобы щенок не видел движения вашей руки и считал, что сам виноват в резком натяжении поводка.

После нескольких 10—30-минутных уроков на фоне отвлекающих факторов ваш питомец будет следить за каждым вашим передвижением, стараясь держаться поблизости.

Когда малыш научится концентрировать свое внимание на вас и хождению рядом на свободном поводке, можно будет сменить четырехметровый дрессировочный поводок на двухметровый прогулочный.

Соберите лишнюю часть поводка в правый кулак и начинайте движение рядом. Если малыш пытается вырваться вперед, приспустите поводок, резко поверните направо и бегите, пока он не бросится вслед за вами. Как только поводок ослабнет, подтяните его правой рукой, чтобы он не путался у вас под ногами. Если щенок обгоняет вас во время бега, резко развернитесь и продолжайте движение в противоположном от него направлении, не сбавляя темпа. Это заставит малыша понять, что ему лучше всегда быть рядом с вами. Как видите, для резкого рывка поводка впол-

не достаточно быстро развернуться и увеличить скорость движения. То есть вам совершенно не нужно делать это рукой на виду у питомца. Таким образом, он считает, что сам виноват в резком натяжении поводка, в то время как вы не имеете к этому никакого отношения.

Если малыш отвлекся и плетется за вами, укоротите поводок, прижав левую руку к бедру, продолжая при этом идти вперед, чтобы поводок ударялся о ваше левое бедро, — это вынудит его идти рядом с вами.

Усадка

При обучении усадке совсем маленького щенка, которому еще нет и двух месяцев, вам потребуется лакомство, терпение и выдержка. Учтите, что, приступив к дрессировке, вы должны находиться в хорошем расположении духа и никогда, запомните это, никогда не должны обижаться на малыша, считая его тупым и бездарным, кричать на него, срывать на нем плохое настроение и свои неудачи, переутомлять и применять физические наказания. В противном случае вы распишетесь в собственном бессилии, а ведь питомец должен видеть в вас лидера.

Ваш малыш с радостью усвоит навык усадки, если вы будете держать кусочек лакомства прямо перед его носом. Скомандуйте ему «Сидеть!», одновременно подняв вверх над его головой вкусный кусочек так, чтобы он не сводил с него глаз. Он вынужден будет запрокинуть голову и рефлекторно опустить круп на пол, чтобы сохранить равновесие. Как только он сядет, сразу же похвалите его и предложите лакомство, например кусочек сыра. Повторите упражнение 5—10 раз, после чего поиграйте с малышом, сходите с ним погулять, накормите и дайте ему поспать. Затем повторите упражнение.

На первых порах не обращайте внимания на то, насколько правильно ваш малыш сел, главное, чтобы он понял, что от него требуется. Отработкой навыка вы займетесь тогда, когда он беспрекословно начнет выполнять команду «Сидеть!».

С четырехмесячного возраста команда должна выполняться из любви и уважения к вам, а не к лакомству. Положите правую руку щенку на грудь, а левую — на круп. Отрывистым и решительным голосом скомандуйте «Сидеть!», одновременно надавливая правой рукой на грудь снизу вверх, а левой — на круп сверху-вниз и вперед. Щенок рефлекторно будет вынужден сесть. Заставьте его остаться в этом положении 10 секунд, после чего похвалите.

Обучить усадке щенка старше пятимесячного возраста можно следующим образом. Наденьте на него дрессировочный ошейник, пристегните к «мертвому» кольцу поводок и подтяните его к себе с левой стороны. Скомандуйте «Сидеть!», одновременно натягивая левой рукой поводок над головой щенка вверх и чуть вперед, а правой — надавливая на круп сверху вниз и чуть вперед. Как только он сядет, тут же ослабьте поводок. Если ваш питомец при этом попытается встать, вновь натяните поводок и, как только он сядет, расслабьте.

Хвалить энергичного и неусидчивого на одном месте пуделя следует ровным, ласковым голосом, а не громким, который может легко возбудить его, усложнив обучение.

Укладка

Учтите, что укладка — поза подчинения. Пудели же самостоятельные и независимые по своей природе, поэтому нередко проявляют упрямство, так что обучение этому навыку потребует от вас огромной выдержки, доброты, а возможно, и поощрения лакомством.

Приступая к обучению трехмесячного щенка, посадите его. Поднесите лакомство к носу питомца, скомандуйте «Лежать!» и опустите руку сначала отвесно вниз, к его передним лапам, а затем отведите ее строго вперед. Пудель потянется за лакомством, его фронт сместится вперед и вниз, и пес вынужден будет лечь, чтобы не упасть. Если он сделает это лишь наполовину, слегка надавите ему на холку левой рукой вниз. Как только он ляжет, сразу же дайте ему лакомство.

Если щенку больше трех месяцев, усадите его рядом с собой на поводке, наклонитесь над ним, возьмите его левой рукой за левое предплечье у локтя (или за плечо, прямо над локтевым суставом), а правой — за правое. Скомандуйте «Лежать!», выждите секунду, чуть приподнимите его конечности над полом и слегка потяните вперед. Потеряв равновесие, ваш питомец вынужден будет лечь, чтобы сохранить равновесие и не упасть. Если он вырывает у вас свои лапы, прижмите его своей грудью, чтобы приподнять их. Когда щенок ляжет, похвалите его спокойным голосом и выждите 10 секунд. Затем скажите «Хорошо!» и поиграйте с ним, разрешив подняться.

Подав команду «Лежать!», не забудьте выждать несколько секунд, прежде чем тянуть питомца за передние конечности. В противном случае у него может не возникнуть ассоциации между укладкой и командой голосом. Тренируйтесь по десять раз в день, пока ваш питомец не научится оставаться в лежащем положении в течение 15 секунд.

Усадка и укладка на выдержку

Как только вашему малышу исполнится пять месяцев, его следует научить выдержке. Надев на него дрессировочную удавку и прикрепив к ней прогулочный поводок, усадите или уложите питомца напротив себя. Затем скомандуйте «Жди!» (или «Место!»), одновременно выбросив прямую правую руку вперед ладонью вверх. Этот жест рукой должен служить сигналом «замри». Если малыш попытается встать, тут же поправьте его, как вы делали это во время его обучения усадке и укладке, но без команды «Жди!», иначе он перестанет обращать на нее внимание.

Навык следует отрабатывать несколько раз в день, чередуя с другими, уже усвоенными командами, играми, прогулками и отдыхом. Начинайте с 10 секунд, после чего каждый раз увеличивайте время выдержки на 5 секунд, пока щенок не будет сидеть или лежать возле вас в течение 20 секунд. Не забывайте, что за каждое правильно

выполненное упражнение щенка следует сразу же похвалить радостно-воодушевленным голосом, а то и потрепать по загривку. Когда малыш научится сидеть или лежать рядом с вами, отойдите от него на несколько шагов, не выпуская из рук поводка, сядьте перед ним на корточки, изображая, что завязываете шнурок или подбираете что-то с земли, например камешек, но ни на минуту не выпускайте ученика из поля своего зрения. Как только он попытается сдвинуться с места, сразу же скомандуйте «Сидеть! Место!» («Лежать! Место!»). Как только щенок займет изначальную позу, медленно отойдите от него. Если он вновь попытается сойти с места, сразу же повторите команду, чтобы он понял, чего вы от него хотите, и не сходил с места, пока вы не разрешите ему это.

Как только малыш усвоит навык, проведите занятия в многолюдном парке, где толпы народа, много других собак и детей, чтобы научить его не отвлекаться на внешние раздражители. Не забывайте сразу же поправлять ученика, если он отвлекся или решил нарушить команду ради того, что вдруг так заинтересовало его, впрочем, как и сразу же хвалить, если он готов услужить вам и с радостью выполнил ваше задание.

Обучив малыша выдержке на прогулочном поводке, замените его на более длинный — дрессировочный. Привяжите его к дереву или к столбу, усадите или уложите ученика, скомандуйте «Жди!» и начинайте не спеша отходить от него. Задача ученика — оставаться на месте, пока вы не появитесь и не отдадите другой команды. Уходя от него на большое расстояние, держа поводок в руке, не забывайте, что вы постоянно должны украдкой следить за своим питомцем, чтобы мгновенно вернуть его на место, если он попытается броситься за вами или пойти в заинтересовавшую его сторону.

Теперь вы можете не только отойти от своего ученика, но и спрятаться от него, держа поводок в руке и все время следя за его поведением. Если он сдвинулся с места, тут же вернитесь к нему и молча заставьте принять исходное положение. Проводите тренировки в разных местах, чередуя укладку и усадку с другими, уже усвоен-

ными командами в разной последовательности, с играми, прогулками и отдыхом, ведь занятия должны быть не монотонными и скучными, а интересными для вас обоих.

ПОКОРНОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ

Покорное мочеиспускание характерно для диких животных, стоящих на низших ступенях социальной лестницы. При встрече их с соплеменниками, занимающими более высокий ранг, они принимают позу подчинения и, присев на корточки, выпускают каплю-другую мочи, подтверждая свое более низкое происхождение. Подобное покорное мочеиспускание наблюдается и у любвеобильных, легко возбуждающихся собак, особенно у сук, демонстрирующих свою преданность владельцу, которого они считают «альфа»-лидером, например, когда тот приходит с работы домой. Но оно может быть не врожденным, а приобретенным, став элементом пассивно-оборонительной реакции, вызванной страхом, особенно если владелец не раз бил или жестоко наказывал своего питомца.

Пудель — мужественная, горделивая, самостоятельная собака с чувством собственного достоинства и невероятной уверенностью в себе, несмотря на преданность владельцу и беспрекословное подчинение ему. Так что, если щенок, радостно встречающий вас после разлуки, весело размахивая хвостом, вертя крупом из стороны в сторону и улыбаясь, выкажет вам покорное мочеиспускание, не наказывайте его. В противном случае он, чтобы угодить вам, будет постоянно делать это от страха, а не от любви и уважения к вам. Вернувшись домой, лучше молча откройте входную дверь и не обращайтесь к радостно встречающему вас малыша, испытывающего бурю чувств, до тех пор, пока он сам не подойдет к вам. Наклонитесь к нему или присядьте перед ним на корточки и, предложив кусочек лакомства или приласкав (погладив по загривку, почесав грудь или под подбородком), скомандуйте «Сидеть!», чтобы вам было за что похвалить своего малыша, придя домой.

Так вы покажете своему питомцу, что уважаете его, во всем доверяете ему, и добьетесь исчезновения покорного мочеиспускания.

Итак, обучение щенка начинается с самых первых минут его нахождения в вашем доме. Обращайтесь с ним ласково, но твердо. Лучше сразу правильно обучать малыша и своевременно приучить его к дисциплине, чем исправлять допущенные ошибки и бороться с неуправляемой собакой.

Пудели во всем стараются угодить своему владельцу, чтобы порадовать его, и прекрасно дрессируются. Начинайте обучение с усвоения простых навыков: «Нет!» и «Нельзя!», особенно если щенок пытается на что-то запрыгнуть. При возможности покажите ему, что вы от него хотите, вместо того чтобы повторять команду. При правильном выполнении навыка тут же похвалите малыша.

Как бы вы ни тренировали и ни дрессировали своего питомца, запишите его на курсы по послушанию. На них вы узнаете много нового, усвоите методы и правила дрессировки, чтобы потом отработать их в домашних условиях, а щенок найдет на них много друзей и научится хорошим манерам.

Если вы собираетесь экспонировать своего пуделя на выставках, вам следует освоить хендлинг — навыки управления собакой, а вашему питомцу — выставочную стойку на земле и столе для груминга, демонстрацию полости рта для осмотра пасти, зубов и прикуса, безропотное прикосновение к себе посторонних людей, усадку и укладку на выдержку, хождение по рингу рядом на свободном поводке, не реагируя на впереди и позади идущих собак, а также на людей и соплеменников, стоящих за рингом, впрочем, как и на выставочный гул и лай. Ставьте щенка на стол 2—3 раза в день на несколько минут, постепенно увеличивая время. После занятий хвалите его, давайте лакомство или играйте с ним. Освоив стойку, обучите щенка хождению рядом на поводке вокруг имитационного ринга и по траектории, требуемой экспертом на выставке. Занятия должны доставлять удовольствие как щенку, так и вам, и не забывайте поиграть с ним во время и после занятий.

7

РАЗВЕДЕНИЕ

Разведение собак — это сочетание науки, искусства, умения предвидения и немного удачи. Задача заводчика — разведение высококлассных, крепких, здоровых, понятливых собак с уравновешенным темпераментом, чтобы сохранить и улучшить породу, выведенную его предшественниками. Он должен стремиться разводить потомство, превосходящее родителей по своим качествам, для чего ему следует предварительно изучить всю имеющуюся литературу, посвященную породе, знать ее стандарт и генетику, проанализировать множество родословных, запастись массой свободного времени, терпением, выдержкой, настойчивостью и невероятной силой воли, чтобы выдерживать все преграды, которые могут встать у него на пути, взлеты и падения, а также иметь свободные деньги, которые могут потребоваться на запланированные и непредвиденные расходы.

Разведение собак — дело убыточное, поэтому тот, кто захочет посвятить себя этому, никогда не должен забывать об этом. Пудель не должен быть данью моде. Эта порода для избранных, не жалеющих сил и времени на общение с ней, на ее популяризацию и сохранение для потомков в своем первоизданном виде. А это означает, что заводчик должен беспокоиться о каждом своем щенке,

подбирать им достойных владельцев и следить за их дальнейшей жизнью.

Нельзя разводить посредственных собак из жалости к ним, иначе вы просто загубите породу. Лучше составьте план разведения и строго следуйте ему. Возможно, вы выбрали неправильный путь и вам придется все начинать сначала — это не страшно, если вы истинный поклонник породы и вас не страшат подводные камни, которые могут встретиться на вашем пути.

Если вы не готовы к этому, не занимайтесь разведением. Не стоит заниматься им и в том случае, если все говорят вам о пользе первой вязки для лучшего развития суки, чтобы вернуть ее стоимость при покупке, из интереса, каких щенков она может дать, или чтобы показать своим детям чудо рождения. Выращивание и уход за щенками обходится намного дороже их реализации, не говоря уже о том, что суке может понадобиться кесарево сечение, часть щенков — погибнуть, а другая — требовать помощи ветеринара. Расходы потребуются также на профилактическую дегельминтизацию щенков, их иммунизацию и купирование им хвостов. Я уже не говорю о тех убытках, которые могут нанести вам несмышленные малыши, старающиеся все попробовать на зуб, стащить все, что, по их мнению, плохо лежит, и разорвать все, что попадется на глаза. Кроме того, оценившаяся сука может обладать настолько высокой материнской доминантой, что может укусить ребенка, резко протянувшего руки к ее сокровищам. Да и смерть родившегося щенка переносится крайне тяжело, особенно детьми.

НАТУРАЛИЗАЦИЯ

Если вы не собираетесь заниматься разведением и посещать выставки, лучше натурализируйте своего питомца. Делать это нужно в препубертатном периоде, до его полового созревания, примерно в полугодовалом возрасте. После овариогистерэктомии у суки не будет двух течек в году, а это означает, что она ничего не перепачкает в доме сво-

ими кровянистыми выделениями, длящимися до трех недель, и не будет стремиться сбежать из дома в этот период, чтобы спариться с кобелем, а вам не придется ночи напролет разыскивать ее, так как инстинкт бродяжничества, присущий течным сукам на вершине охоты, не призовет ее к странствиям. Стерилизация помогает суке сохранять спокойный нрав, а отсутствие течки не мешает ей участвовать в различных испытаниях и состязаниях. Кроме того, у натурализованных сук уменьшается риск развития рака грудных желез, рака и инфекционных заболеваний матки или яичников. Короче говоря, натурализация суки в препубертатном периоде обеспечивает ей более здоровую жизнь, а вам — меньше хлопот и неприятностей.

Кастрация кобеля до достижения им годовалого возраста поможет уберечь его после полового созревания от заболеваний и рака предстательной железы и сделает его равнодушным к течным сукам, ради которых, в отличие от фертильных собратьев, он не будет выламывать дверь, выбивать окна, ломать забор, то есть сносить все на своем пути, лишь бы заполучить их. Кроме того, кастрированный кобель не будет метить все углы в вашей квартире, учуяв запах течной суки, проявлять агрессии к собрату в борьбе за нее и имитировать копулятивные движения, обхватывая вашу ногу передними лапами.

Многие избегают натурализации своих питомцев из-за того, что верят ложным слухам, например о том, что кастрированный кобель и стерилизованная сука теряют интерес к жизни, становятся флегматичными и ожирелыми. Но причина ожирения кроется в перекармливании собаки и гиподинамии, а не в натурализации. В действительности натурализованные собаки более послушные и легче обучаемые, чем фертильные, так как более внимательные и менее рассеянные, поэтому часто побеждают на испытаниях и состязаниях. Кастрированные кобели практически не отвлекаются на внешние раздражители, целиком концентрируя внимание на своей работе, а стерилизованные суки участвуют в испытаниях и соревнованиях в любое время года, так как у них нет течек, выбивающих их два раза в год на 6—8 недель из колеи.

Не стоит бояться, что ваш кастрированный кобель не будет охранять вас и не сможет защитить при необходимости. Наоборот, он не только будет стойчески защищать дом и всех его обитателей, но и концентрироваться на этой задаче лучше фертильных собратьев, думающих только о течных суках. То же самое можно сказать и о стерилизованных суках.

И последнее, не думайте, что, натурализовав питомца, вы добьетесь лишь того, что он всю жизнь будет помнить об этом и стараться вам отомстить. Нет, ваш малыш станет еще более преданным вам и послушным.

ПЛЕМЕННАЯ СУКА

Первичный характер суки формируется в первые недели жизни, что связано с гормональным фоном. Вне течек для сук характерны многие повадки кобелей из-за преобладания в их крови андрогенов, поэтому в этот период они являются как бы бесполоми существами, сохраняя при этом всю свою женственность.

Половой зрелости суки достигают в возрасте 7—9, реже 10—11 месяцев, что связано с геобиохимическими условиями окружающей их среды, с содержанием и кормлением. Так, суки, рожденные в осенне-зимний период в средней полосе, созревают раньше, чем рожденные в весенне-летний период.

Наступление первой течки констатирует лишь вступление собаки в новый период развития, начало полноценной функции яичников и ряда гормонов. В это время заканчиваются рост собаки в высоту, отдельные процессы развития органов и ряда систем. Но формирование суки и ее физиологическое развитие еще продолжают. Еще не сформирован костяк, продолжается развитие мышечного каркаса и характера. Так что наступление половой зрелости, или фертильности, еще не означает, что сука подготовлена к щенности, щенению и воспроизводству полноценного потомства. Зачастую у нее отсутствует материнская доминанта.

Ранние вязки пагубно сказываются на здоровье, экстерьере, работоспособности и продолжительности жизни собаки, ведут к провисанию спины, малоплодию, преждевременной старости и рождению нежизнеспособного потомства или щенков с различными пороками развития.

Окончательное созревание и полное физическое развитие наступает у сук в возрасте 1,5—2 лет. К этому времени у них стабилизируется гормональный фон, формируется тазовое кольцо и развиваются мышцы тазового дна.

Поздние вязки так же вредны для сук, как и ранние, так как ведут к преждевременному угасанию половых инстинктов и извращению характера — злобности и агрессивности к кобелям. Кроме того, с четырехлетнего возраста тазовое кольцо у сук окончательно утрачивает свою эластичность, что зачастую ведет к вторичному сужению родовых путей и тяжелой щенности, как правило заканчивающейся кесаревым сечением. С возрастом наступают и гормональные расстройства, проявляющиеся в нарушении цикличности течек, частых пропустовках, склонности к ожирению и нарушениях обмена веществ.

Вот почему для первой вязки следует использовать сук в возрасте от года и восьми месяцев до трех лет.

Способность сук к щенности сохраняется в среднем до десятилетнего возраста, правда, после восьми лет их все-таки лучше не вязать, так как количество овулирующих яйцеклеток у них начинает резко уменьшаться, а плоды нередко бывают крупными и не могут пройти вход в тазовое кольцо. Наибольшая плодовитость у сук наблюдается в возрасте 4—7 лет.

Эстральный цикл

Владелец суки должен обладать большой наблюдательностью, замечать все изменения, происходящие с его питомцей, и вести дневник, отражая в нем день и месяц наступления течки, ее продолжительность и интервалы между ними. Это необходимо для определения оптимальных сроков вязки, выработки тактики поведения для выгула суки,

проведения ей профилактической дегельминтизации, иммунизации и гигиенических мероприятий.

Пустовкой, или течкой, является период физиологических, гормональных и психологических качеств суки, способствующих функции воспроизводства. В этот период она способна к оплодотворению и допускает кобеля к совокуплению.

Фертильная сука пуделя дважды в год, как правило весной и осенью, что соответствует биоритму живых организмов, входит в период половой охоты, называемый гоним, течкой или эструсом. Период покоя между ними длится полгода. Первая течка наступает в возрасте 6—12 месяцев. Она может быть скрытой, кратковременной или смазанной. После этого течки повторяются со строгой периодичностью в течение всей жизни собаки. Интервал между первой и второй течкой может быть от 6 до 8—9 месяцев. Далее он стабилизируется и составляет примерно 6—7 месяцев.

Промежутки между пустовками строго индивидуальны. Если сука не была повязана, время до следующей пустовки сокращается. Обычно течка длится 18—21 день и включает три периода: начальный, половой охоты и затухания.

Пустовке предшествует проэструс — выброс гормонов желтого тела (ФСГ — фолликулостимулирующий гормон гипофиза и ЛГ — лютеинизирующий гормон), что проявляется в увеличении и плотном набухании петли. Когда в процесс включаются яичники и эстрадиол, из нее появляются ярко-красные кровянистые выделения. Первые капли могут сопровождаться субфебрилитетом и небольшой вялостью, причем владелец может не заметить выделений, особенно если сука слишком чистоплотная и тщательно вылизывает свои гениталии. У некоторых сук с появлением из петли первых выделений наблюдается отход от собственных привычек — они начинают вдруг все грызть, становятся менее послушными, а некоторые теряют обоняние. Дня через два сука становится игривой, более подвижной, начинает проявлять повышенный интерес к окружающему и к запахам. Она чаще мочится, причем может начать делать это даже в доме, где до этого проявляла невероятную

чистоплотность, и проявляет интерес к кобелям. А те нередко начинают преследовать их уже на этой ранней стадии. Но суки, заигрывая перед ними, не подпускают их к себе. Они заманивают их в свои сети, чтобы напасть. При их приближении суки мгновенно присаживаются на корточки или проявляют агрессивное поведение, если те пытаются выполнить садку.

На 7—9-й дни алые выделения становятся бледно-кремовыми или бледно-желтыми, а петля — мягкой и рыхлой на ощупь, что говорит о наступлении второй стадии течки — эструса. Владелец должен ежедневно проверять качество выделений по фильтровальной бумаге. Появление светлого ободка вокруг красной кровяной капли позволяет предположить готовность суки к вязке, а ее поведение должно подтвердить это. Теперь сука становится дружелюбной к кавалерам и не прочь заманить их в свои сети, принимая экстравагантные, далеко не двусмысленные позы. При их подходе она уже не огрызается, а, наоборот, замирает на месте в стойке, испытывая внутреннее напряжение, напоминая сжатую спираль, и приподнимает петлю. Если вы проведете рукой от холки к крупу, она замрет в такой же позе. Именно на этой стадии, обычно продолжающейся до 10—14-го дня, у суки происходит овуляция (выброс яйцеклеток из лопнувших граафовых пузырьков яичников к воронке маточной трубы и спуск их к ампулам рогов матки). Если в этот срок произойдет вязка, то мириады сперматозоидов, пробившись в матку благодаря вращательному движению своих хвостиков, щелочной среде предстательной железы кобеля и рефлекторным сокращениям мышц живота суки во время нахождения в замке (когда разбухшие луковицы у корня эрегированного полового члена, каверны которого переполнены кровью, делают его твердым, чему, кстати, способствует и кость полового члена, плотно сжаты циркулярными мышцами влагалища), смогут заполнить ампулы рогов матки и «обгрызть» лучистый венец спрятавшихся там яйцеклеток. Причем самый энергичный из них (только он один!) пробьется внутрь яйцеклетки и приведет к ее оплодотворению, после чего она крепко прикрепится к ампуле рога матки, чтобы начать

деление и дать новую жизнь в темных, влажных глубинах организма суки.

Если этого не произойдет, течка перейдет в завершающую стадию, нередко продолжающуюся до 21-го дня или даже дольше. Во время этого периода сука все еще привлекает кобелей, но уже не желает иметь с ними дела.

Период пустовки длится в целом 22—25, реже 28 дней. Чаще всего она протекает по одному из нижеперечисленных путей.

1. Эструс длится 3—5 дней и через 1—3 дня переходит к послетечке.

2. Эструс длится 5—8 дней при отсутствии максимальной готовности, после чего постепенно, в течение 3—5 и более дней, происходит медленный переход к послетечке.

3. Эструс длится 1—2 дня с максимальной готовностью на 12—13-й дни, после чего сразу же прекращается.

4. Эструс длится 6—10 дней и более, но готовность возникает только в начале, после чего падает и вновь поднимается уже ближе к концу, ни там ни там не достигая максимума. Переход к послетечке может быть как быстрым, так и медленным.

5. Эструс длится 6—10 дней и более, имея два пика готовности (на 7-й и 15-й дни), максимум которой приходится на один из них.

6. Эструс длится 6—10 дней и более, имея два пика максимальной готовности на 8-й и 15-й дни.

Интервал между пиками при двухфазной течке может составлять неделю, если не больше, во время которого активность половых желез снижена.

7. Прерывистая пустовка — выделения начинаются и через 3—7 дней полностью прекращаются. Спустя 3—7 дней и более пустовка возобновляется. При этом стадия предтечки может быть очень короткой или нормальной.

Иногда у сук, у которых отмечаются две следующие друг за другом с небольшим интервалом течки, встречается явление суперфетации, или добавочной щенности, так как она может повязаться в обе из них. В этом случае плоды от первого зачатия рождаются в срок, а от второго мо-

гут появиться на свет вместе с ними или только с помощью кесарева сечения.

Компактно, быстро идущий процесс овуляции чаще приводит к многоплодию, даже после одного спаривания.

К пролонгированной, затянувшейся овуляции склонны суки с нарушением обмена веществ, чаще всего с ожирением, а также суки преклонного возраста с пониженной фертильностью. Такая овуляция может быть одной из причин бесплодия.

Течная сука требует особого ухода и постоянного контроля со стороны владельца. Эстральный цикл, как и поведение во время него, индивидуален для каждой суки — одних из них можно вязать раньше указанного выше срока, других — позже. Поскольку кобели сидят под вашей дверью с первых же признаков течки у суки до полного спадения у нее петли и ждут, когда природа окончательно развеет ее запах с вашего двора, вам следует на протяжении всего эстрального цикла держать свою питомицу в хорошо запертом помещении. Нередко течные суки умудряются сбежать из дома, ловко перехитрив своих владельцев, и ударяются в бега, а кобели готовы на все, чтобы добиться вашей «девочки», даже если им придется прорывать лаз под вашим забором или перепрыгивать его.

Если вы запланировали повязать суку, стоящую в плане вязок, то последняя вакцинация от вирусных заболеваний должна быть проведена не позднее чем за месяц, а дегельминтизация — не менее чем за три недели до вязки. Вы должны оберегать ее от незапланированных случек, иначе она принесет вам помет из-под разных кобелей.

ПЛЕМЕННОЙ КОБЕЛЬ

В норме кобель рождается с уже опустившимися в мошонку яичками. Реже отмечается вторичное вхождение яичек в брюшную полость с повторным их опущением в 3—5-месячном возрасте. Иногда отмечается неполное опу-

щение яичек из-за короткого семенного канатика или их перекрута, и они надолго остаются в паховом канале.

Владелец должен уметь отличать крипторхизм, то есть неопущение одного или обоих яичек в мошонку, от монорхизма и анорхизма, когда у щенка нет одного или обоих яичек. Односторонний крипторхизм нередко является приобретенным из-за нарушений во время внутриутробного развития, неправильного выращивания щенка и перенесенных им в раннем возрасте заболеваний. Реже он является врожденным пороком развития генетического происхождения. Двухсторонний крипторхизм, как и отсутствие одного или двух яичек, является наследственным.

Племенным может считаться только тот кобель, который имеет два яичка нормальных размеров и плотности в мошонке.

Полового созревания кобель достигает в возрасте 8 месяцев, но это не означает, что он готов к вязкам. В этом возрасте у него еще продолжается физиологическое развитие, включая формирование костяка, сердечно-сосудистой и нервной систем. Тонус уже не властвует над собакой — его место занял гипоталамус. Несмотря на это, рефлекс эрекции еще пока контролируется спинным, а не головным мозгом, кора которого еще не пробудилась ото сна, из-за чего у кобеля еще молчат рефлекс половое поведение, несмотря на то, что его половые инстинкты уже находятся на чеку.

Ранние вязки крайне вредны для несформировавшегося щенка и могут привести к тому, что кобель развалится и состарится раньше времени, потеряв характерные черты экстерьера. У него будет мягкая, провисшая спина, огрублость форм, нарушения психики...

Если вы планируете использовать кобеля в племенной работе, не забывайте, что он должен находиться в рабочей кондиции, получать высокосбалансированный корм, обогащенный белками, витаминами, особенно витамином Е, и минеральными веществами, получать ежедневные физические нагрузки и иметь должный темперамент. Он должен периодически обследоваться на наличие в кале яиц глистов, вовремя проходить иммунизацию от

особо опасных заболеваний собак, ежегодно проверяться на стафилококконосительство, а в сельской местности — на бруцеллез. У него не должно быть экзопаразитов, семейственных и наследственных заболеваний.

Огромное значение имеет качество ухода за племенным кобелем — оно должно быть крайне тщательным. Сюда входит своевременная борьба с экзо- и эндопаразитами, профилактика заболеваний и своевременное их лечение.

Если вы заметили, что у кобеля лихорадка или он находится на стадии реконвалесценции, не пускайте его в вязки, как минимум, три недели от момента полного выздоровления.

Пускать кобеля в вязки можно не ранее полуторагодичного возраста и с уже развязанной сукой, имеющей опыт спаривания. Кобеля можно использовать для вязок круглый год, но в первый год за молодым кобелем закрепляют не более 3—4 сук (6—8 вязок в год), а в возрасте 3—8 лет — 10—15 (20—30 вязок в год).

У молодых, впервые использующихся в разведении кобелей, а также у редко использующихся и старых собак рекомендуется ежегодно проверять сперму на азоо- и некроспермию.

Использование кобелей осуществляется до 8-летнего возраста, и только в особых случаях, при племенной ценности, их можно пускать в вязки до 10—12-летнего возраста.

Отдержка кобелей, как и сук, никакого вредного влияния на их здоровье не имеет! Собака — социальное животное, занимающее определенную ступень на иерархической лестнице. Это означает, что в стае вяжутся только лидеры, стоящие на ее вершине, а остальные ее члены занимаются воспитанием их потомства, охраной логова и занимаемой ими территории, а также добыванием пищи. Так что в вязке заинтересован владелец, а не его питомец. Если вы не готовы заниматься разведением, не вяжите свою собаку, она прекрасно проживет и без этого.

Если кобель содержится в питомнике или в смычке (в паре с сукой), то во время течек его нужно изолиро-

вать от сук, поместив подальше от них, во избежание нервного срыва и так называемого перегорания, связанного с чрезмерно длительным возбуждением без соответствующей разрядки, что может привести впоследствии даже к его бесплодию. Частые вязки также вредны для кобеля — он не успевает восстановить потерю белков, качество спермы, раньше времени стареет и теряет способность к воспроизводству, а кроме того, дает низкокачественное потомство с пониженной жизнеспособностью, щенков с уродствами и аномалиями развития.

Старых кобелей используют в разведении по строгим показаниям — их препотенции, высококлассному экстерьеру и породному типу. Их вяжут, как правило, с молодыми, крепкими, еще не развязанными суками, после чего дают корм, богатый белками и витаминами, предоставляют хороший отдых и свободный моцион не менее 1—1,5 часов.

У кобелей, которых никогда не вязали, к 5—6 годам половой инстинкт обычно угасает, отмечается азоо- или некроспермия.

Запомните, работа половой системы кобеля не имеет собственного ритма, а зависит от половой активности суки. А также то, что лучший возраст производителей, способных давать полноценное потомство, — 3—7 лет.

Итак, кобель пуделя начиная с восьмимесячного возраста и до самой старости готов повязать любую течную суку. Однако в слишком жаркие, удушливые дни не стоит пускать его в вязки, так как разгоряченный воздух пагубно влияет на ткань яичек, самой природой выведенных из брюшной полости с температурой в 40—41 °С в мошонку, где она, как минимум, на 4—5 °С ниже, снижая продукцию сперматозоидов в клетках Лейдига и даже приводя к временному стерилитету. В противном случае повязанная с ним сука может прохолостовать, то есть остаться пустой. При острой необходимости используйте для вязки ранние, еще прохладные утренние часы или вечерние, когда спадет жара. Если же суку все-таки привезли на вязку днем, поместите ее на несколько часов в тени, пока кобель отсидится в прохладном помещении.

Прежде чем пускать пуделя в разведение (это касается кобелей и сук), у него должны быть исключены наследственные заболевания. Правда, одно из них, орхизм, видно у кобелей наглядно (так как у сук, которые могут быть носительницами этого гена, нет яичек, его нельзя увидеть у них воочию), без каких-либо дополнительных методов исследования. Это отсутствие в мошонке одного или обоих яичек. Некоторые односторонние крипторхи вполне могут дать потомство, но пускать их в вязки нельзя, так как они несут в своем генотипе связанный с полом признак орхизма, а это означает, что все родившиеся из-под него суки будут носительницами этого гена, а кобели — одно- или двухсторонними крипторхами. Лучше всего кастрировать таких кобелей, чтобы не закрепить признак орхизма в породе и предупредить перерождение неопустившегося яичка в злокачественное новообразование из-за воздействия на его ткань высокой температуры внутри брюшной полости.

Если у вашего малыша яички не опустились в мошонку, не паникуйте. Иногда они опускаются и вновь уходят в брюшную полость, не полностью опускаются или мигрируют в паховом канале, что называется плавающим яичком, вплоть до 4—5-месячного возраста, когда окончательно опускаются в мошонку.

ОТБОР И ПОДБОР ПАР

Хороший заводчик начинает племенную работу с высококлассной суки с уравновешенным темпераментом и трезво оценивает, насколько она соответствует идеалу, описанному в стандарте пуделя. При этом он не должен забывать, что идеальных собак в природе не бывает, ведь каждая из них имеет свои сильные и слабые стороны. Он должен скрупулезно изучить историю происхождения пуделя, чтобы четко знать, какие черты, присущие этой породе, ему следует сохранить, кинологическую литературу, посвященную селективному разведению собак, вопросы ухода за сукой в дородовом и послеродовом периодах и за новорож-

денными щенками. Не зная основ генетики, не разбираясь, чем тесный инбридинг отличается от линейного разведения, а тот от ауткросса, не стоит приступать к разведению. Генетика дает понимание того, как наследуется тот или иной признак, из-за чего возникает инбредная депрессия, как добиться прогресса в разведении и избежать ошибок.

Начинается разведение с селекции племенных собак, отбора и подбора пар. При подборе пары заводчик тщательно изучает происхождение кобеля, осматривает всех его близких родственников, чтобы выяснить все плюсы и минусы его семейства или линии, собирает все данные о них у владельцев и разведенцев, проверяет его здоровье, психику, экстерьер и темперамент. Заводчики пуделей ведут разведение по принципу: «лучшее с лучшим дает лучшее». Это означает, что, если у суки имеется какой-то незначительный недостаток, ее партнер должен быть лишен его, а не иметь контрпризнак. Наложив друг на друга альтернативные, контрастные признаки, вы получите в потомстве щенков с промежуточным признаком или половину с признаками матери, а половину — с признаками отца, так и не увидев золотой середины.

Прежде чем вязать свою суку, заводчик исключает наличие у нее наследственных пороков развития, обследует ее на дисплазию тазобедренного сустава и стафилококконосительство, а также на заболевания, передающиеся половым путем, такие, как бруцеллез. Добросовестный заводчик, серьезно относящийся к племенной работе, требует того же и от владельца племенного кобеля.

Решив повязать свою суку, заводчик должен договориться с другими разведенцами, имеющими щенных сук, чтобы они разрешили ему присутствовать на щенении. В этом случае он приобретет опыт и навыки по принятию щенков, уходу за новорожденными и их матерью. У хорошего заводчика имеются все возможности для щенения суки, заранее подготовленное место для здорового помета, время для ухода за щенками, их тренинга и обучения, вплоть до реализации малышей. Он готов в любую минуту забрать проданного щенка, если новые владельцы отказываются от него, и умеет ухаживать за осиротевшими малышами.

ВЯЗКА

Владелец суки должен хорошо знать эстральный цикл своей собаки и интервалы между ними. Он должен заранее договориться с владельцем кобеля о дне вязки, обсудить условия ее проведения и оплаты за нее, которые при встрече должны быть подтверждены документально, желательно в присутствии юриста.

Кормить собаку и давать ей воду рекомендуется не ранее, чем через 3—4 часа после вязки.

Вязка проводится не чаще одного раза в год, что необходимо для восстановления физиологических и экстерьерных качеств суки, а также обменных процессов в ее организме.

Предполагают, что в 50—70% случаев бесплодие у сук объясняется неправильным определением срока вязки.

В подготовительный период суку следует привести в рабочую кондицию, так как у ожиревших собак щенность протекает более тяжело и нередко отмечается малоплодие, мертворождение и ранняя смертность щенков.

Перед самой вязкой нужно надеть на суку намордник и зафиксировать ее голову своими руками, чтобы она не укусила кобеля во время садки, особенно если у нее еще нет сексуального опыта. Владелец молодого неопытного кобеля должен поощрять своего питомца взобраться на суку, похлопывая его по крупу и говоря «Ап!». Если он не совсем понимает, что нужно делать и как, владелец должен поднять его за передние конечности и поставить лапы на спину суки. При этом, почувствовав прикосновение члена кобеля к петле, сука может залаять, спугнув неопытного кобеля, пытающегося сделать садку. Владелец должен поощрять кобеля к тому, чтобы он не обращал на лай суки никакого внимания и продолжал садку.

Как только он сделает ее и начнет выполнять копулятивные движения, чтобы ввести член во влагалище, ему можно помочь, приподняв петлю суки или направив его член к ее половой щели (правда, не все кобели позволяют дотрагиваться руками до своего члена, поэтому, если это происходит, тут же спрыгивают с суки). При введении чле-

на его шершавая головка раздражает слизистую влагалища, приводя к сокращению его кольцевых мышц и сдавливанию луковиц полового члена, что и называется склещиванием. Разбухшие луковицы усиливают эрекцию и вызывают семяизвержение. Когда кобель войдет в замок, сильные сокращения продольных мышц тела и рогов матки способствуют раскрытию канала матки и всасыванию спермы к вершинам рогов и яйцепроводам. Приводят к этому также простагландины спермы и ритмичное сокращения мышц живота суки. Убедившись, что собаки находятся в замке, аккуратно снимите передние конечности кобеля с суки и поставьте их рядом с ее передними конечностями или разверните на 180° и поставьте задом к ней, иначе ей, бедной, придется держать его на себе более 20 минут, если не больше, в течение которых длится склещивание. В это время сука становится послушной, так что намордник с нее можно будет снять.

Иногда из-за каких-то нарушений в строении влагалища суки кобель не может ввести в него член на всю длину (в этом случае вы увидите увеличенные луковицы его полового члена вне петли), поэтому склещивания не происходит. Чтобы оплодотворение произошло, кобеля нужно удержать на месте, чтобы он не соскакивал с суки, как минимум, пять минут. А вот держать суку после этого за задние конечности, приподняв корпус, абсолютно не нужно, так как кобель вводит в ее матку такое количество сперматозоидов, которого с лихвой хватит на то, чтобы оплодотворить десятки тысяч сук. Замка может не быть по разным причинам: из-за некоторого несоответствия партнеров, торопливости и перевозбуждения молодого кобеля, луковицы полового члена которого набухают раньше, чем он введет член во влагалище, по неопытности суки, которая может присесть во время садки, вытолкнув член из влагалища, и т. д.

Если кобель сделал садку, но не сумел ввести член во влагалище, семяизвержение произойдет наружу, а не в матку. В этом случае его лучше увести на 15—30 минут в другую комнату, чтобы он успокоился, после чего можно будет повторить вязку.

Владелец суки должен все время следить, чтобы его питомица, находясь в замке, не вздумала лечь или сесть, иначе она травмирует себя или кобеля. Как только кобель выйдет из замка, собак разводят в разные изолированные помещения. Для большей уверенности в оплодотворении через день проводят повторную, контрольную вязку (сперма кобеля сохраняет свою активность в матке в течение суток).

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

Оплодотворение — проникновение сперматозоидов в цитоплазму яйцеклетки, слияние их ядер и образование зиготы, способной расти и развиваться, давая начало новому организму.

Ооцит первого порядка состоит из цитоплазмы с включением желточных зерен и шаровидного ядра. Он покрыт желточной оболочкой, поверх которой располагается прозрачная оболочка, а на ней — лучистый венец, защищенный фолликулярными клетками, склеенными между собой вязким веществом из класса мукополисахаридов и содержащими гиалуроновую кислоту. Ооциты живут недолго. Если через 6—10 часов после их выхода из фолликула в них не проникнут сперматозоиды, они погибнут.

Эффективность спаривания зависит от своевременности их оплодотворения. Ооцит, покинувший фолликул, засасывается фибрами яйцепровода (воронкой) за счет ворсин последнего и отрицательного давления в матке. За счет антиперистальтики яйцепроводов яйцеклетки медленно движутся по ним.

Фолликулярная жидкость активизирует сперматозоиды, благодаря чему они могут некоторое время сохранять свои качества, находясь в теле и вершине рогов матки. Их подвижность усиливается за счет простагландинов семенной жидкости, которые приводят также к раскрытию канала матки и усилению ее сократимости, из-за чего в яйцепроводах создается отрицательное давление, что ускоряет встречу сперматозоидов с яйцеклетками. Гиалуронидаза сперматозоидов способствует повреждению лучистого венца, а сек-

рет предстательной железы — созданию в матке щелочной среды, что приводит к увеличению активности сперматозоидов. Благодаря всему этому сперматозоиды начинают «обгрызать» лучистый венец, продвигаясь все ближе и ближе к «сердцу» ооцита. Пока они проникают в околожелточное пространство, ооцит успевает пройти второе мейотическое деление, в результате чего в его ядре находится не диплоидный, а гаплоидный набор хромосом, как и в сперматозоиде. Вот тогда-то наиболее подвижный из сперматозоидов и проникает в цитоплазму ооцита второго порядка. Хвост у него отпадает, клетки ядер сливаются, давая начало новому организму — зиготе. Зигота постепенно продвигается к матке, а дойдя до ампулы рога, останавливается и фиксируется в ней.

Развитие эмбриона, которому предстоит стать плодом, может быть нарушено на разных этапах внутриутробного развития и по ряду причин: при спаривании после овуляции, что приводит к развитию нежизнеспособных щенков, при слишком раннем спаривании, из-за чего имплантации зиготы в ампуле рога матки не происходит, при аллергической реакции организма суки на сперму кобеля, из-за чего у нее вырабатываются антитела на нее — спермагглютинины, спермотоксины и т. д., которые приводят к гибели зиготы.

На эмбриогенез отрицательно влияет как слишком высокий, так и чрезмерно низкокалорийный корм. При голодании суки в ее крови происходит резкое снижение уровня глюкозы, что приводит к нарушению функции гипофиза и, как следствие, расстройству процесса имплантации зиготы, обуславливающему ее гибель.

У ожиревших сук оплодотворение может не произойти вследствие биологической неполноценности ее яйцеклеток или гибели эмбрионов на самых ранних стадиях их развития.

Через четыре дня после оплодотворения зигота начинает быстро делиться и расти. В это время формируется желточный пузырь, зародыш и зародышевые оболочки: водная — амнион, мочева — аллантоис и сосудистая — хорион. В аллантохорионе возникает кровеносная сеть — разветвление пупочных сосудов. Хорион вместе со слизистой оболочкой матки образует плаценту, или детское место.

В эмбриональном развитии выделяют три периода: зародышевый, предплодный (переходный период от зародышевого к плодному) и плодный. Предплодный период, во время которого происходит закладка всех органов, заканчивается в конце первого триместра щенности. Плодный период длится от конца предплодного до рождения щенка. В это время продолжают расти и развиваться все органы эмбриона, благодаря чему он превращается в плод.

Процессы ассимиляции у плода значительно преобладают над процессами диссимиляции, что обеспечивает его быстрый рост. Плоду не надо тратить много энергии, так как его внутренние органы, за исключением сердца, почти не функционируют, потери тепла нет, а двигательные реакции его органов не требуют больших затрат энергии.

Кишечник у плода начинает слабо функционировать лишь во второй половине эмбрионального развития. В нем выделяются ферменты и скапливается меконий (первородный кал). Почки плода вырабатывают зародышевую мочу, а печень — желчь.

Со второй половины щенности прослеживается шевеление плода. Оно усиливается от действия механических факторов (давления), при повышении температуры в его тканях и чрезмерного накопления в них двуокиси углерода, а также при изменении состава крови матери. Плод обладает кожной чувствительностью.

Головной мозг эмбриона находится в состоянии покоя, как бы в глубоком сне. У плода функционируют внутрисекреторные железы, вырабатывающие инсулин, гормон роста и другие.

ЩЕННОСТЬ

Итак, вы успешно повязали свою суку с кобелем, не уступающим ей ни по экстерьеру, ни по происхождению, ни по темпераменту, и теперь считаете по календарю недели до предполагаемых вами родов, начиная с дня вязки.

В среднем щенность длится 60 дней плюс-минус 2 дня. Щенки, рожденные ранее 57-го дня, обычно нежизнеспособны.

собны, а задержка щенения более 70 дней грозит гибелью плодов в половых путях суки.

Средняя продолжительность щенности и количество плодов изменяются с возрастом — первая увеличивается, а второе — уменьшается.

Важным значением является снижение веса суки перед вязкой на 15—20%. Среди ожиревших сук и выше средней упитанности наблюдается больше собак с пониженной плодовитостью, рождающих мертвых щенков, имеющих мало молока, и, как следствие, высокий отход молодняка. Но нельзя допускать и истощения суки.

Убедившись, что сука щенная, держите ее под контролем, обеспечьте ей тщательный уход и выгул, а также рациональное кормление, пока она не ощенится. В первую половину беременности, как правило, моцион и рацион суки не меняются. Если аппетит суки резко возрастает, то вводят дополнительное кормление с уменьшенным количеством корма.

Оптимальным является питание, содержащее 50% белка, 36,5% жиров, 13,5% углеводов и повышенный уровень витаминов и микроэлементов.

К концу первого периода щенности у суки отмечается расширение нижних отделов грудной клетки — она становится ближе к бочкообразной. Ежедневное взвешивание собаки позволяет оценить прибавку в весе. К концу четвертой недели собака становится более спокойной, больше спит. Аппетит может как резко снизиться, так и возрасти, вплоть до волчьего. Сука начинает чаще мочиться, что требует более частого ее выгула, но продолжительностью не более 20 минут.

Во второй половине беременности моцион и рацион суки следует изменить. Ее следует перевести на корм для лактирующих сук, разбив суточную норму на 4—5 кормлений. При необходимости в корм добавляют минерально-витаминную подкормку. Кальций дают только вместе с глицерофосфатом кальция в соотношении 1,5:1,3 и витамином D₃.

С этого времени избегают больших физических нагрузок, прыжков, восхождения по лестнице, купания в теплой

воде. Не следует брать собаку на руки и разрешать ей валяться весь день на кровати. Пусть и не столь активный, но моцион ей крайне необходим. Теперь заводчик должен уделять особое внимание физиологическим отправлениям щенной суки, кал которой должен быть мягким, так как щенные суки склонны к запорам. Если суку крепит, ей дают натуральные послабляющие препараты — сок апельсина, растительное масло с кормом с пониженным содержанием углеводов или тетравит. Кроме того, со второй половины щенности сука должна наблюдаться ветеринаром, который должен быть осведомлен о примерном дне ее щенения, чтобы в случае необходимости мгновенно прийти ей на помощь.

К концу 6-й недели щенности петля суки как бы раскрыта, из нее, чаще в конце акта мочеиспускания, появляются слизистые выделения. К концу 7-й недели, за 10—15 дней до щенения, у суки отмечается огрублость грядок и шевеление плодов. В это же время приготовьте родильный бокс и дайте суке привыкнуть к нему, чтобы ей не пришлось искать место для щенения на свой вкус.

За неделю до щенения необходимо снизить объем корма на 20—30%. В это время ей скармливают наиболее полноценные по белку корма. При естественном рационе за 5 дней до щенения для профилактики предэклампсии из него следует исключить мясо.

За 2—3 дня до щенения плотный, раздувшийся, как бочка, живот опускается (у суки вновь появляются чуть подтянутые паха, а поднимающаяся от мечевидного отростка грудины к паховой области нижняя линия корпуса становится прямой), аппетит пропадает или отмечается привередливость к еде, соски набухают, становятся из бледно-розовых ярко-красными, и при малейшем прикосновении из них начинает сочиться молозиво (особенно из половых сосков). Сука спит так крепко, что не слышит, как вы открываете коробку с лакомством для собак, а пробудившись, становится беспокойной и не отходит от вас ни на минуту, буквально преследуя по пятам.

За день до щенения сука отказывается от еды, начинает метаться, крайне возбуждена и может даже поскуливать.

За 12 часов до родов вы обнаружите, что ректальная температура у нее понизилась на 1,5—2 °С.

С приближением родоразрешения сука старается найти уединенное, темное место, может начать готовить логово, яростно скребя, подрывая под себя подстилку и тяжело дыша. Проверьте, чтобы родильный бокс стоял в теплом месте без сквозняков, а на его дне лежало несколько слоев газет (они хорошо впитывают жидкость, поглощают запах, и их легко менять при загрязнении). Постарайтесь, чтобы ваша питомица, готовящаяся стать матерью, не покидала его, так как с появлением хаотичных схваток некоторые суки становятся беспокойными, начинают метаться и подыскивать новое место для будущих малышей. Я знаю немало случаев, когда владельцы, пришедшие домой с работы, заставляли своих пуделей с новорожденными щенками на диване, в кресле, в детской кроватке малыша, в кладовке и даже в бельевице.

С появлением потуг сука начинает часто и тяжело дышать. Присмотревшись к ней, вы увидите, как напрягаются и расслабляются мышцы ее живота. Ритмичные схватки могут длиться несколько минут, после чего как бы замирают, чтобы возобновиться с новой силой. В это время первородящая сука может поскуливать и даже рычать, с удивлением и непониманием оглядываться на петлю, присаживаться на корточки, словно бы собираясь помочиться или опорожнить кишечник, или просто лежать на боку. Потуги — это тяжелый труд, хотя и не такой уж болезненный, как это кажется со стороны. При прохождении первого плода по родовым путям и прорезывании головки, задних конечностей или ягодиц (при тазовом, или ягодичном, предлежании плода, наблюдающемся в норме в 40% случаев) некоторые суки издадут вопль, что абсолютно естественно. Но если сука кричит с определенной регулярностью, срочно вызовите ветеринара.

ЩЕНЕНИЕ

Владелец щенной суки должен готовиться к ее щенению заблаговременно, контролировать ее прибавку в весе, следить за изменением в ее поведении и в привычках. Я уже подчеркивал, что он заранее должен приготовить родильный бокс (для стандартного пуделя он должен быть не менее 120 × 120 см, для миниатюрного — 90 × 90 см, а для тоя — 60 × 60 см) и поставить его в спокойном, тихом, теплом, свободном от сквозняков, затемненном месте, вдали от отопительных систем и проходов. Он должен находиться несколько выше уровня пола.

За несколько дней до щенения необходимо подготовить стерильные салфетки, йод, прямые тупоконечные ножницы, шелковые или капроновые нитки и много хорошо впитывающих воду тряпок, а также полностью состричь у суки все волосы в области грядок (будьте при этом крайне осторожными, чтобы не травмировать или не поранить грудные железы), вокруг петли и на внутренней поверхности задних конечностей машинкой с насадкой номер 10.

Щенение состоит из трех периодов. В подготовительном периоде, длящемся в среднем до 24 часов, отмечается вялость собаки, отказ от приема пищи и снижение ректальной температуры тела с 37,2—37,8 °С до 36,7 °С. Это самый надежный признак наступления родов — щенки должны родиться в течение суток, во всяком случае, вы должны быть к этому готовы.

В первом периоде отмечается появление хаотичных схваток, о чем вы уже успели прочесть выше. Во втором периоде схватки приобретают правильный, ритмичный характер. Шейка матки раскрыта. Как правило, сука лежит на боку. Если она продолжает метаться по квартире, а из петли показался околоплодный пузырь, уложите суку и успокойте ее. Во время ритмичных потуг отмечается выход плода. Чаще всего пузырь остается при этом целым. После этого сука грубо вылизет новорожденного, переворачивая с боку на бок, освобождая его носовые ходы и пасть от слизи, чтобы он заскулил и мог свободно дышать, и стимулируя первое в его жизни мочеиспускание и отхождение мекония.

Некоторые пудели, разорвав околоплодный мешок, сначала съедают послед, вылизывают щенка, а уж потом перегрызают пуповину. Подобная последовательность действий тоже считается нормальной. Если пузырь вскрылся самостоятельно, а сука не перегрызает пуповину, ей необходимо помочь. Пуповина перевязывается на расстоянии двух пальцев от пупочного кольца щенка, а затем перерезается между ниткой и плацентой. Если сука сама не вылизывает щенка, его необходимо грубо протереть тряпкой, пока он громко не запищит, сделав первый в своей жизни вдох. При необходимости протрите его рот марлевой салфеткой, чтобы удалить из него слизь. Если щенок не скулит, то можно попробовать сделать контрастную ванну, то есть окунуть его в горячую, а затем в холодную воду. Другой способ освободить пасть щенка и носовые ходы от попавшей в них слизи — взять его в руки, зафиксировав голову, поднять прямые руки над головой, широко расставив ноги, и резко опустить их, как при колке дров.

Щенки одинаково часто рождаются как головкой, так и ягодицами. И то и другое — абсолютно нормально. Каждый малыш появляется на свет в околоплодном пузыре (в рубашке), как бы плавая в околоплодных водах, если, конечно, они не отошли за несколько минут до его рождения из-за разрыва околоплодных оболочек. В этом случае он вынужден будет пройти родовые пути всухую. Это встречается не так уж и часто, хотя и считается абсолютно нормальным явлением.

Прежде чем возвращать малыша суке, убедитесь, что он хорошо дышит и двигается.

Послед рождается вслед за новорожденным (или перед рождением следующего плода), после чего из петли вытекает небольшое количество зеленоватой жидкости. Если сука решит съесть послед, не противьтесь этому — биологически активные вещества, содержащиеся в нем, и питуитрин пробуждают материнскую доминанту (инстинкт), стимулируют родовую деятельность, секрецию молозива и инволюцию матки по завершении родов.

Количество родившихся последов должно точно соответствовать числу новорожденных. Так что тщательно счи-

тайте их, чтобы вовремя заметить задержку последа, что может привести к различным осложнениям. Если послед так и не родился, срочно вызовите ветеринара.

В промежутках между рождениями щенков суки, как правило, отдыхают, и пара новорожденных, до появления третьего малыша, может всю наслаждаться молозивом. Перерыв между рождениями щенков у пуделей обычно длится 20—30 минут, хотя и может доходить до 1—2 часов. Пока потуги заканчиваются рождением щенка — все идет хорошо. Иногда встречаются молниеносные роды, когда щенки практически непрерывно рождаются один за другим, из-за чего сука не успевает даже вылизывать их. В этом случае вам придется взять часть ее забот на себя.

ОКОНЧАНИЕ РОДОВ

Об окончании родов говорит то, что сука начинает спокойно и ровно дышать, успокаивается, сворачивается вокруг малышей, прижав их к своей груди, с горделивым видом осматривает и обнюхивает их, а те, распределив соски, либо молча наслаждаются молозивом, либо мирно спят, не выпуская соска изо рта. Все время щенения рядом с сукой должна стоять миска с чуть подслащенным молоком, с чаем или с водой.

После того как сука отдохнет несколько минут со своими щенками, ее нужно насильно вывести из родильного бокса и выгулять (большинство сук в первые дни после родов категорически отказываются отлучаться от своих малышей даже на минуту). В это время кто-нибудь из членов семьи должен убрать из бокса всю грязь и постелить свежую подстилку. Прежде чем разрешить матери вновь забраться к детям, тщательно вытрите ее влажным теплым полотенцем. Делайте это быстро, поскольку суки сильно нервничают, оказавшись вдали от своих щенков.

Первые сутки после щенения лучше не кормить суку, а предоставить ей свободный доступ к воде.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ЩЕНЕНИЯ

Эклампсия

О развитии эклампсии (молочная лихорадка) будут говорить следующие симптомы: нервозность, отказ заботиться о щенках или кормить их, неукротимая дрожь, лихорадка, нарушение координации движений из-за ригидности мышц. Эклампсия — смертельно опасное заболевание, требующее экстренной помощи ветеринара — внутривенного введения глюконата кальция (при этом, как образно говорят, выздоровление наступает на конце иглы). Как правило, эклампсия наблюдается у первородящих сук или в первые три недели лактационного периода.

Мастит

Это еще одно серьезное заболевание, встречающееся в послеродовом периоде, сопровождающееся болезненным, горячим на ощупь уплотнением одной-двух молочных желез. В этом случае щенки отлучаются от матери и переводятся на искусственное питание промышленным заменителем сучьего молока или подкладываются под молочную няньку (приемную мать). Суке же проводится курс антибиотикотерапии.

Гипотермия щенков

Новорожденным щенкам требуется тепло, так как до трехнедельного возраста они не способны поддерживать постоянную температуру собственного тела. Замерзший щенок не усваивает молозиво и быстро погибает от переохлаждения и голода. Как же узнать, достаточно ли комфортно вашим малышам, холодно или жарко им в родильном боксе? Чтобы ответить на эти вопросы, проследите за тем, как они спят.

Если им холодно, они сбиваются в кучу, навалившись друг на друга, если жарко — расползаются по всему боксу, а если комфортно — спят рядом, слегка касаясь друг друга телами.

Чтобы малышам не было холодно, установите над одним из углов родильного бокса настольную лампу в 200 ватт или положите под одну из половин подстилки электрогрелку. Когда малышам станет жарко, они перейдут на более прохладную половину.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЩЕНКАМИ

Здоровые новорожденные щенки 90% времени спят, а 10% — едят. Их сон крайне активен — они подергивают конечностями, туловищем и причмокивают, не давая мышцам застыть.

Другим признаком отменного здоровья является способность щенка энергично сосать молоко, быстро находить и не выпускать изо рта излюбленный сосок матери.

Владелец ежедневно должен следить за прибавкой щенков в весе, пока им не исполнится три недели, после чего взвешивает их еженедельно.

Сука кормит своих малышей, тщательно вылизывает и стимулирует мочеиспускание и дефекацию с момента их рождения и до трехнедельного возраста.

Щенки рождаются слепыми и глухими. Прозревают они на 10—15-й день, а несколько дней спустя начинают слышать. В возрасте 2—3 недель у них появляются временные, острые как иголки молочные зубы, которые начиная с четырехмесячного возраста постепенно сменяются на постоянные, или коренные. Как только когти малыша начнут загигаться, как рыболовный крючок, тут же подстригите их, иначе, массируя грудь матери во время сосания молока, он оцарапает ее ими, что может привести к маститу. С двухнедельного возраста процедура подстригания когтей должна стать регулярной — раз в 7—10 дней.

Адаптация щенков к окружающему их миру начинается с момента их рождения и до реализации заводчиком. С трехнедельного возраста они начинают узнавать людей и получать удовольствие от общения с ними. Вам следует уде-

лять внимание каждому малышу, беря их по очереди на руки, лаская и говоря с ними. С четырехнедельного возраста начинайте по очереди выносить малышей из бокса на десять минут в день, отлучая от матери и однопометников по крайней мере четыре раза в неделю. Постепенно увеличивайте время разлуки и делайте это все чаще и чаще, а также приучайте их к посторонним дружелюбным людям, к добрым детям, соплеменникам и другим животным.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СУКОЙ

Первые дни после щенения у суки отмечается склонность к диарее (поносам), связанной с послабляющим действием последов. В специальном лечении сука не нуждается, но если стул не нормализуется, то ей дают настой коры дуба, семени льна или рисовый отвар.

Выделения из петли в течение трех недель из кровянистых становятся сначала печеночными, а затем слизистыми, после чего прекращаются.

Материнский инстинкт усиливается с переходом молока в молоко. Большое значение при этом имеет уход суки за щенками. Она тщательно вылизывает их, поедает их кал, что вызывает у нее послабляющий эффект.

Если у суки гипо- или агалактия, то щенков переводят на искусственное вскармливание.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЩЕНКОВ

Первым человеком, которого видит щенок, раскрыв глаза на расплывающийся перед ним смутный мир, как правило, оказывается заводчик, в крайнем случае — один из членов его семьи. Хотя малыш уже узнает заводчика по прикосновениям, ему предстоит связать свои тактильные ощущения с его запахом и речью, чему способствуют развивающиеся у него обоняние и слух. Если он когда-нибудь лизал или сосал палец заводчика, то знает его и на вкус. Кроме матери и однопометников, малыш узнает и громоз-

дящееся над ним создание, которое попеременно пахнет то мылом, то чесноком, то духами. Через общение с двуногим родителем у щенка формируется первое мнение о людях в целом.

Некоторые заводчики гладят щенков по спине и переворачивают их, чтобы ласково почесать грудь, как только у них отпадет пуповина. Часами гладить новорожденных не следует, а вот уделять каждому из них по несколько минут в день — крайне необходимо, поскольку щенки привыкают к заводчику с первых же дней своей жизни.

Как замечательно усестись на пол и дать бойким малышам изучать ваши ноги, заползая на вас, — это очень полезно для их физического и умственного развития. Кроме групповых игр, не забудьте поиграть с каждым малышом в отдельности. Щенку пуделя требуется несколько минут индивидуального общения наедине с человеком. Именно в это время он начинает доверительно относиться к людям, формируясь как личность.

От рождения до шестнадцатинедельного возраста каждый щенок проходит определенные критические периоды социального развития, причем самый ответственный и короткий из них приходится на возраст 3—7 недель. Если в этот период щенку уделяли мало внимания и не развивали его умственные способности, он вряд ли станет личностью и сможет реализовать все возможности своего характера.

В трех-пятинедельном возрасте для социализации щенку требуется четырех-десятиминутное индивидуальное общение с дружелюбно настроенным человеком хотя бы 4 раза в неделю, а с пятинедельного — около пятнадцати минут. Щенок должен понять, что взрослые и дети — его хорошие друзья. Пока щенки не прошли иммунизации от особо опасных заболеваний, не разрешайте им общаться с посторонними людьми и животными, включая собак.

Во время индивидуальной социализации приучите малышей ко всем видам покрытий. В хорошую погоду выносите их на лужайку, дайте поиграть на цементном полу, познакомьте с полами, покрытыми коврами, кафелем, линолеумом и деревом.

Если вы крайне заняты и не можете уделить щенкам должного внимания, займитесь отдельно с каждым из них, пока смотрите телевизор или читаете книгу.

Игрушки из пластиковых бутылок помогут превратить скучную комнату щенков в веселую. Набравшись храбрости, подойдя к одной из них и обнюхав ее, малыш, считая себя победителем, схватит ее и потащит куда-нибудь. Такая игра позволит ему поверить в свои силы и стать самоуверенным. Если малыши, вместо того чтобы тянуть, рвать и трясти игрушки, пытаются разгрызть и съесть их, оставите проказников и не разрешайте им больше играть в свое отсутствие.

Вам следует приучить щенков к различным домашним шумам и звукам, чтобы они не реагировали на них или связывали с чем-то приятным. Начните с того, что, прежде чем положить в миску корм, постучите по ней ложкой.

ОТЛУЧЕНИЕ ЩЕНКОВ ОТ МАТЕРИ

В продаже имеются различные корма для щенков разного возраста, начиная с сучьего молока и каш, кончая сухими кормами. Прикорм вводится с трехнедельного возраста. Кормить малышей можно из тяжелой сковородки, а если помет большой — из двух.

Большинство щенков не умеют лизать, так что вам придется показать им, как это нужно делать. Для этого слегка ткните малыша раз-другой губами в миску со смесью. Он вынужден будет облизаться, после чего, возможно, начнет сам лакать из миски. У вас под рукой должно быть полотенце, чтобы вытереть малыша, если тот извоится в смеси.

Сука обычно кормит своих малышей до семинедельного возраста, правда, все реже и реже. В возрасте 3—4 недель вы будете давать им прикорм 2 раза в день, в 4—5 недель — 3, а в 5—7 недель — 4. В возрасте 4—5 недель малышей начинают переводить на сухие корма для щенков, а в 5—6 недель — постепенно отнимать от груди матери, разрешая сосать ее только в ночные часы.

МИНУТА РАССТАВАНИЯ

Итак, щенки уже не нуждаются в материнском молоке, научившись есть твердую пищу, прошли период социализации, иммунизацию, заводчик купировал им хвост, подготовил копию их родословной, общепометную карточку и ветеринарный паспорт на каждого. Теперь они готовы покинуть дом, чтобы приобрести нового владельца.

Продавая щенков, заводчик должен дать покупателю схему кормления щенка и перечень кормов, которые тот получал у него.

Д79 Дубров М.З.
Пудель. — «Библиотека российского собаководства». — М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2003. — 139 с.

ISBN 5-227-00963-5

Книга посвящена пуделю — породе собак разнообразных размеров и окрасов. Читатель узнает из нее историю происхождения этой удивительной и универсальной породы, ее стандарт, правила выбора щенка и ухода за ним, основы разведения пуделей, а также о профилактике ведущих заболеваний, наиболее часто встречающихся у них.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)-445

Дубров Михаил Зориевич

ПУДЕЛЬ

Издается в авторской редакции
Художественный редактор *И.А. Озеров*
Технический редактор *Л.И. Витушкина*
Корректор *Т.В. Вышегородцева*

Изд. лиц. ЛР № 065372 от 22.08.97 г.
Подписано к печати с готовых диапозитивов 03.09.2003.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,56. Уч.-изд. л. 7,97.
Доп. тираж 5 000 экз. Заказ № 4301032

ЗАО «Издательство «Центрполиграф»
111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 15
E-MAIL: CNPOL@DOL.RU

WWW.CENTRPOLIGRAF.RU

Отпечатано в ФГУИПП «Нижполиграф»
603006, Нижний Новгород, Варварская ул., 32